

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b> | <b>AB – Bəzi infeksiyon və parazitər xəstəliklər</b> |
|---------------------------------|--|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b> | <b>Kazımova Z.</b> |
|---|--------------------|

| <b>XBT-10 rubrikası</b> | <b>Xəstəliklər</b>   |
|-------------------------|--|
| <b>A25.1</b>            | Streptobasilloz<br>Epidemik oynaq eriteması<br>Heyverhil qızdırması<br>Siçovul dişləməsindən törəyən streptobasillyar qızdırma |

### **Müalicə**

Streptobasillozun müalicəsi üçün **Penisilin (Penicillin), Tetrasiklin (Tetracycline) və ya Doksisiklin (Doxycycline)**, ə/d inyeksiyalar təyin edilir. Müalicə 7-10 gün ərzində aparılır.

Endokarditin inkişafı ilə Penisilin dozası artır və müalicə müddəti 4 həftəyə qədər uzadılır. Antibiotiklər – **Klindamisin (Clindamycin) və ya Eritromisin (Erythromycin)** daxilə, 7-10 gün ərzində - Penisilinlərə qarşı allergik reaksiyalar üçün ehtiyat dərmanlar kimi istifadə olunur.

### **Ədəbiyyat**