

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	AB – Bəzi infeksiyon və parazitər xəstəliklər
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Camalova Ü.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
A37.0	<i>Bordotella pertussis</i> tərəfindən törədilən göy öskürək
A37.1	<i>Bordetella parapertussis</i> tərəfindən törədilən göy öskürək

Müalicə

Dərman müalicəsi:

Antibiotik terapiyası:

Klaritromisin (clarithromycin) 15 mq/kq/gün, 7 gün, daxilə

və ya

Azitromisin (azithromycin) 10 mq/kq/gün, 5 gün, daxilə

və ya

Amoksisillin (amoxicillin) 30-60 mq/kq/gün, 7-10 gün ərzində daxilə.

Yaş öskürək üçün:

Ambroksol (ambroxol) 5 yaşa qədər uşaqlar - 7,5 mq; 5 ildən 12 yaşa qədər uşaqlar - 15 mq; 12 yaşdan yuxarı uşaqlar - 30 mq, 2-3 dəfə, 5-7 gün.

Quru spazmatik öskürək üçün:

Butamirat sitrat (butamirate) (Sinekod) 2 aydan 1 yaşa qədər - gündə 4 dəfə, 10 damcı;

1 ildən 3 ilə qədər - gündə 4 dəfə, 15 damcı;

3 ildən 6 yaşa qədər - gündə 4 dəfə, 25 damcı;

6 ildən 12 yaşa qədər - gündə 3 dəfə, 10 ml şərbət;

12 yaşdan - 5-7 gün ərzində gündə 3 dəfə, 15 ml şərbət.

Spazmatik öskürək davam edərsə:

Salbutamol (salbutamol) 2-6 yaşlı uşaqlar- gündə 3 dəfə, 100-200 mkq/kq;
6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün inhalyasiya üçün dozalı aerosol (100 mkq/doza) gündə 4 dəfə, 1-2 inhalyasiya;

2 yaşa qədər uşaqlar:

Fenoterol (fenoterol) (Berotec və ya Berodual) gündə 3 dəfə, inhalyasiya yolu ilə, 1 damcı/kq;

10-14 gün spazmatik öskürək dayanana qədər.

Ədəbiyyat

Диагностика и лечение детей с инфекционными заболеваниями

Версия: Клинические протоколы 2006-2019 (Беларусь)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BF-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-2012/16274>