

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	AB – Bəzi infeksiyon və parazitər xəstəliklər
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Kazımova Z.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
A38	Skarlatina

Müalicə

Qeyri-dərman müalicəsi:

Rejim: yataq (bütün kəskin dövr ərzində);

Pəhriz: masa No 13, 15. Kiçik porsiyalarla ilıq içkilər. Süd-tərəvəz pəhrizi.

Xəstənin ciddi gigiyenası: ağız boşluğunun selikli qişalarına gigiyenik qulluq.

Dərman müalicəsi:

- ağız-udlağın antiseptik məhlullarla yuyulması: gündə ən azı 3 dəfə **Nitrofuril (Nitrofuril)** 0,02% (1:5000) sulu həlli ilə. Sulu məhlulu hazırlamaq üçün 1 tablet, 100 ml distillə edilmiş və ya qaynadılmış suda həll edilir.
- 38,5°C-dən yuxarı hipertermik sindromu aradan qaldırmaq üçün **Parasetamol (Paracetamol)** 10-15 mq/kq, ən azı 4 saat fasilələrlə, üç gündən çox olmayaraq, daxilə və ya rektal və ya **ibuprofen (Ibuprofen)** 5-10 mq/kq, dozada gündə 3 dəfə, daxilə;
- yüngül, silinmiş formalar üçün, desensibilizasiya terapiyası məqsədilə **Xloropiramin (Chloropyramine)** 1-2 mq/kq, gündə 2 dəfə, 7 gün ərzində.
- yüngül formalarda: **Amoksisillin (Amoxicillin) + Klavulan turşusu (Clavulanic acid)** 40 mq/kq, daxilə, gündə 3 dəfə, 7-10 gün ərzində.

Amoksisillin + klavulan turşusuna qarşı əks hallarda makrolidlər istifadə olunur:

Midekamisin (Midecamycin) 20-40 mq/kq, gündə 3 dəfə, 7 gün ərzində və ya **Azitromisin (Azithromycin)** birinci gün 10 mq/kq, sonra daha dörd gün 5 mq/ kq, gündə bir dəfə, daxilə

və ya 6 aydan 12 yaşa qədər etibarən **Klaritromisin (Clarithromycin)** hər 12 saatda bir, 7,5 mq/kq (maksimum doza 500 mq), 7 gün ərzində.

Ədəbiyyat

Klinik protokollar (Kazaxstan):

Скарлатина

Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/14849>