

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	AB – Bəzi infeksiyon və parazitər xəstəliklər
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Kazımova Z.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
B00.0	Herpetik ekzema Kapoşi sindromu (çiçəyəbənzər səpgilər)
B00.1	Herpetik vezikulyar dermatit Sadə herpes virusu tərəfindən törədilən: • facialis(üz) • labialis (dodaq) İnsanın (alfa) 2- herpesvirusu tərəfindən törədilən: • qulağın vezikulyar dermatiti • dodağın vezikulyar dermatiti
B00.2	Herpetik gingivostomatit və farinqotonzillit Herpetik faringit
B00.3	Herpetik meningit (G02.0*)
B00.4	Herpetik ensefalit (G05.1*) Herpetik meninqoensefalit Törədici «B» herpes virusu olan meymun xəstəliyi
B00.5	Gözün herpetik xəstəliyi Sadə herpes virusu tərəfindən törədilən: • konyuktivit (H13.1*) • göz qapağı dermatiti (H03.1*) • iridosiklit (H22.0*) • iritit (H22.0*) • keratit (H19.1*) • keratokonyuktivit (H19.1*) • ön uveit (H22.0*)
B00.7	Yayılmış (səpələnmiş) herpes xəstəliyi Sadə herpes virusu tərəfindən törədilən sepsis
B00.8	Herpes infeksiyalarının digər formaları Herpetik hepatit (K77.0*) Barmağın distal falanqasının yumşaq toxumasının irinli herpetik iltihabı (L99.8*)
B00.9	Dəqiqləşdirilməmiş herpes infeksiyası

Müalicə

Dərmansız müalicə:

Rejim: yarım yataq rejimi (bütün qızdırma dövründə).

QEYD! xəstə gigiyenasına riayət etməli: ağız, gözlərin və burnun selikli qişalarına qulluq etməlidir.

Pəhriz: Cədvəl № 13; hissə-hissə isti içkilər, süd-tərəvəz pəhrizi.

Dərman müalicəsi:

desensibilizasiya məqsədilə **Xloropiramin (Chloropyramine)** gündə 1-2 mq/kq, daxilə və ya parenteral olaraq gündə 2 dəfə, 5-7 gün ərzində;

yerli: 5% **Aciklovir (Aciclovir)** məlhəmi istifadə edin, 4-6 tətbiq; və ya

Brilliant yaşılın 1% (brilliant green) spirt məhlulu (UD D) və ya 2%

Kalium permanganatın (Potassium permanganate) (UD D) məhlulu;

selikli qişalarda səpgiləri anilin boyalarının sulu məhlulları ilə müalicə edin;

stomatit, gingivit, **Asiklovir** həblər 100 mq (2 yaşa qədər uşaqlar), 200 mq

(2 yaşdan yuxarı uşaqlar), 5 gün ərzində **insan rekombinant IFN alfa-2b**

(Interferon alfa-2b) ilə birlikdə rektal şamlar şəklində 150.000 IU, 500000

IU, 1000000 IU; 10 gün ərzində gündə, 2 dəfə, 1 şam;

Residiv kursu halında, rekombinant IFN alfa-2b ilə müalicə kursu rektal şamların 150.000 IU, 500.000 IU, 1.000.000 IU, gündə 2 dəfə, 1 şam şəklində aparılır.

Hər 6 aydan bir rekonvalesentlərin kliniki-laborator müayinəsi, infeksiya ocaqlarının sanitarlaşdırılması.

Ədəbiyyat

Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса у детей

Клинические протоколы МЗ РК - 2017 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5->

**%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%
BE-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0-
%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/15059**