

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b> | <b>AB – Bəzi infeksiyon və parazitər xəstəliklər</b> |
|---------------------------------|--|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b> | <b>Kazımova Z.</b> |
|---|--------------------|

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>XBT-10 rubrikası</b> | <b>Xəstəliklər</b>            |
| <b>B37.6</b>            | Kandidoz endokarditi (I39.8*) |

### **Müalicə**

**Müalicə:**

Fəsadların (perivalvular abses, kəskin ürək çatışmazlığı, septik emboliya və insult) inkişafının qarşısını almaq üçün infeksiyon endokarditi olan xəstələrə ambulator parenteral antibiotik terapiyası təyin edilir. Müalicənin iki mərhələsi var: birincisi kritikdir (ilk 2 həftə), bu müddət ərzində APTA məhdud göstəricilərə malikdir; ikincisi davam edir (2 həftədən sonra), bunda daha çox mümkündür.

b-laktamlar

***Benzilpenisilin natrium duzu (Benzylpenicillin sodium salt)***

Yetkinlər: hər 6 saatda 250.000-500.000 ədəd; gündəlik doza 1.000.000-2.000.000 ədəd; maksimum – gündə 40.000.000-60.000.000 ədəd venadaxili; 1 yaşa qədər uşaqlar - 50.000-100.000 ədəd/kq/gün; 1 yaşdan yuxarı uşaqlar - 50.000 ədəd/kq/gün; ağır infeksiyalar üçün 200.000-500.000 vahid/kq/gün. Gündəlik doza 4-6 inyeksiyaya bölünür.

***Ampisillin (ampicillin)***

Böyükər. Hər 4 saatda 2 q v/d; 1 ay və ya daha böyük uşaqlar: 300-400 mq/kq/gün v/d hər 4 saatdan bir. Maksimum doza: 12 q/gün

1 yaş və ya daha böyük: 200-300 mq/kq/gün v/d, hər 4-6 saatdan bir bölünür. Maksimum doza: 12 q/gün. Müalicə müddəti: ən azı 4-8 həftə.

**Sefazolin (cefazolin)** böyüklər: hər 6 saatdan bir, 1-1,5 q v/d və ya hər 8 saatdan bir, 2 q, v/d;

Uşaqlar 1 ay və ya daha çox: 100 mq/kq/gün, v/d və ya ə/d, 3 və ya 4 bölünmüş dozada; 1 yaş və ya daha çox: 100 mq/kq/gün, v/d, bölünmüş dozalarda, hər 8 saatdan bir. Maksimum doza: 12 q/gün. Müalicə müddəti: ən azı 4-6 həftə.

### **Əlavə dərmanlar:**

b-laktamlar

### **Amoksisilin/klavulanat (Amoxicillin+Clavulanic acid)**

Böyüklər. İnfeksiyanın ağırlığının asılı olaraq hər 8 saatda 1000 mq/100 mq **və ya** hər 12 saatda 2000/200 mq təyin edilir. Çox ağır infeksiyalar üçün doza hər 8 saatdan bir 2000 mq/200 mq-a qədər artırıla bilər.

Çəkisi 40 kq-dan az olan uşaqlar

3 aylıq və daha böyük uşaqlar: Təvsiyə olunan doza hər 8 saatdan bir kiloqram bədən çəkisi üçün 25 mq/5 mq təşkil edir.

3 aydan kiçik və ya çəkisi 4 kq-dan az olan uşaqlar: hər 12 saatdan bir kiloqram bədən çəkisi üçün 25 mq/5 mq.

Sulfanilamidlər

### **Ko-trimoksazol (Co-Trimoxazole)**

Böyüklər. **Sufometoksazol** 4,800 mq/gün; **Trimetoprim** 960 mq/gün (v/d 4-6 inyeksiya)

Uşaqlar. **Sufometoksazol** 60 mq/kq/gün və **Trimetoprim** 12 mq/kq/gün (v/d 2 dozada)

## **Ədəbiyyat**

Острый и подострый эндокардит (инфекционный эндокардит)

Клинические протоколы МЗ РК - 2019 (Казахстан)

https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82-2019/16483