

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	AB – Bəzi infeksiyon və parazitər xəstəliklər
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Kazımova Z.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
B47.0	Həqiqi misetoma Mikoğlu Madura dabanı Maduromikoz

Müalicə

Müalicə:

Aktinomisetomaların bütün hallarda iki dərmanın kombinasiyası istifadə olunur. Onlardan biri həmişə **Streptomisin sulfatdır**, bir ay ərzində, gündəlik 14 mq/kq dozada və bundan sonra hər gün.

A.maduræ səbəb olduğu misetoma olan xəstələrdə **Dapson (Dapsone)** səhər və axşam 1,5 mq/kq dozada, daxilə təyin edilir. S.somaliensis-in törətdiyi misetomalarda da ilk olaraq Dapsonla müalicə aparılır, lakin 1 aydan sonra nəticə olmadıqda, iki dozada **Ko-trimoksazol (Biseptol) (co-trimoxazole) (Biseptol)** həblər, 23 mq/kq/günə dəyişdirilir. A. pelletierii-nin yaratdığı misetomalar **Streptomisin və Ko-trimoksazola** daha yaxşı cavab verir, eyni N. brasiliensis üçün də tətbiq olunur.

Amikasin yan təsirlərinə görə ikinci sıra dərmandır. Müalicə 3 həftə ərzində, iki dozada, 15 mq/kq/gün və 5 həftə ərzində, gündə 35 mq/kq **Biseptol** qəbulundan ibarətdir. Dövr iki dəfə təkrarlanır, bəzən üçüncü kurs tələb olunur. M. mycetomatis-in yaratdığı eumisetoma tez-tez gündə 2 dəfə 200 mq **Ketokonazol (ketoconazole)** və operativ yerli təmizlənmələrə cavab verir.

Gündə 2 dəfə, 200 mq **İtrakonazolun (itraconazole)** uğurlu istifadəsinə dair sübutlar var. Acremonium fasciforme, Aspergillus flavus və ya Fusarium tərəfindən törədilən misetomaların nadir hallarda gündə iki dəfə, 200 mq **İtrakonazol** qəbulu yaxşı cavab verir. **Liposomal amfoterisin B-**

nin v/d tətbiqi *M. grisea* və *Fusarium* spp. ümumi dozada 3,5 q və maksimum gündəlik doza 3 mq/kq. Dərman müalicəsinin bütün hallarında müalicə ən azı 10 ay davam etdirilir.

Ədəbiyyat

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0>