

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>AB-Bəzi infeksiyon və parazitar xəstəliklər</b>
---------------------------------	--

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Camalova Ü.</b>
---	--------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>B85</b>	<b>Pedikulyoz və ftirioz</b>
<b>B85.2</b>	<b>Dəqiqləşdirilməmiş pedikulyoz</b>

## **Müalicə**

### **Baş və qasıq biti:**

**Permetriə** (permethrin) əsaslanan preparatlar müxtəlif buraxılış formalarında istifadə olunur:

1% krem, saxlama müddəti 10 dəq, bir dəfə;

1% gel, saxlama müddəti 40 dəq, bir dəfə;

0,2-0,5% losyon, dərmandan asılı olaraq 10 dəq 40 dəq qədər, bir dəfə;

0,4-1,5% şampun, dərmandan asılı olaraq 10 dəq 20 dəq qədər, 7-10 gündən sonra təkrar;

0,5% sərt sabun, saxlama müddəti 20 dəqiqə, 7-10 gündən sonra təkrar;

5%-dən 25%-ə tərkibində permetrin olan emulsiya konsentratları - dərmandan asılı olaraq işləyən sulu emulsiyalarda permetrinin konsentrasiyası 0,1%-dən 0,3%-ə qədər, saxlama müddəti 20-40 dəq, bir dəfə.

*Piretroid qrupundan olan digər insektisidlər şampunlara daxildir, adətən permetrin ilə qarışdırılır:*

**d-fenotrin 0,2%;**

**Permetrin 0,7%, tetrametrin 0,5%, piriproksifen 0,05%;**

**Permetrin 0,7%, bioalletrin 0,03%.**

Bütün dərmanlar üçün qalma müddəti 10 dəq. 7-10 gündən sonra təkrar müalicə.

**Alternativ vasitələr:**

**Malation** (malathion)

-aerozol qablaşdırmada istifadəyə hazır məhsul (malation qarışığı, 0,5%; permetrin, 1%; piperonil butoksid, 4%), saxlama müddəti 10 dəq, birdəfəlik istifadə;

-emulsiya konsentratı (41%), işləyən sulu emulsiya 0,5% malation, saxlama müddəti 10 dəq, birdəfəlik istifadə.

**Fention** (fenthion) emulsiya konsentrat şəklində və ya tək 20%, 24% və ya permetrin ilə qarışıqda (ümumi konsentrasiya - 10%, 20%) preparatlarda aktiv tərkib hissəsi kimi daxil edilir; işçi emulsiya konsentrasiyası 0,1%-dən 0,25%-ə qədər (istehsalçının göstərişlərinə uyğun olaraq).

16-18 yaşdan başlayaraq istifadəsi icazə verilir.

**Benzil benzoat** 20% konsentrasiyada, sprej şəklində (saxlama müddəti 30 dəq, birdəfəlik istifadə) və losyon şəklində (saxlama müddəti 10 dəq, birdəfəlik istifadə).

**Polidimetilsiloksanlar (dimetikonlar)**

- losyon dimetikon (4%) və izopar (96%) qarışığı, 15 dəq saxlama müddəti, 7-10 gündən sonra təkrar müalicə tələb olunur;

-sprej dimetikon (4%) və izopar (96%) qarışığı, 15 dəq saxlama müddəti, 7-10 gündən sonra təkrar müalicə tələb olunur;

- sprej dimetikon (4%) və oksiftirin qarışığı, 8 saat saxlama müddəti, birdəfəlik istifadə;

- mayelər 92% dimetikonlar (müxtəlif dərəcələrə malik iki dimetikonun qarışığı), saxlama müddəti 45 dəq, 7-10 gündən sonra təkrar müalicə tələb olunur;

- mayelər 4% dimetikon, saxlama müddəti 8 saat, 7-10 gündən sonra təkrar müalicə tələb olunur.

**Mineral yağlar** şampun şəklində istifadə olunur, **klirol** (69,25%) tərkibli, saxlama müddəti 10 dəq, 7-10 gündən sonra təkrar müalicə tələb olunur.

**İzopropil miristat** tərkibində izopropil miristat (50%) və siklometikon (50%) qarışığı olan maye şəklində tətbiq olunur, saxlama müddəti 10 dəq, 7-10 gündən sonra təkrar müalicə tələb olunur.

**Efir yağları** spirt losyonu şəklində istifadə olunur (yalnız baş bitlərinin müalicəsi üçün istifadə olunur):

- anis yağı, 6%, saxlama müddəti 30 dəq, bir dəfəlik istifadə;
- mixək yağı, 10%, saxlama müddəti 30 dəq, bir dəfəlik istifadə.

### **Hamilə və süd verən qadınların müalicəsi:**

Hamilə qadınlarda baş bitlərinin müalicəsi üçün **permetrin** məhlulundan istifadə etməyə icazə verilir (5% etanolda emulsiya konsentratından hazırlanmış və ya 4% dimetikon tərkibli losyondan).

### **Uşaqların müalicəsi**

Pedikulisidlərin əsas hissəsi 5 yaşından başlayaraq uşaqlarda müalicə etmək üçün istifadə olunur. Yalnız istisnalar 5 yaşdan kiçik uşaqlarda istifadə üçün təsdiqlənmiş bəzi dərmanlardır:

- 1% **permetrin** əsaslı gel, 1 yaşdan yuxarı uşaqlarda istifadə üçün təsdiq edilmişdir. Saxlama müddəti 40 dəq, birdəfəlik istifadə;
- tərkibində **malation** və **permetrin** qarışığı olan preparat (müvafiq olaraq 0,5% və 1%) və sinergist **piperonil butoksid** (4%), 2,5 yaşdan yuxarı uşaqlarda istifadəsi icazə verilir. Saxlama müddəti 10 dəq, birdəfəlik müalicə.

## **Ədəbiyyat**

Педикулез

Версия: Клинические рекомендации РФ 2013-2017 (Россия)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0>

[%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84/15243](#)