

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>D - Qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri</b>
---------------------------------	--

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Qaziyeva S.</b>
---	--------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>D 65</b>	<b>Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma (defibrinasiya sindromu)</b> Daxil edilib: Qazanılmış afibrinogenemiya Sərf edilən koagulopatiya Diffuz və ya disseminə olunmuş damardaxili koagulyasiya (DJC) Qazanılmış fibrinolitik qanaxma Fibrinolitik purpura İldırımsürətli purpura

## **Müalicə**

- Xəstəliyin səbəbinin müalicəsi
- Bəzən əvəzedici terapiya göstərilir (məsələn, trombositlər, kriopresipitat, təzə dondurulmuş plazma)
- Bəzən heparin

Müalicənin prioritet istiqaməti xəstəliyin səbəbi ilə dərhal mübarizə aparmaqdır (məsələn, şübhəli qram-mənfi sepsisin geniş spektrli antibiotiklə müalicəsi, vaxtından əvvəl plasentanın ayrılması üçün uterusun çıxarılması, hipervolemiya). Müalicə effektiv olarsa, yayılmış damardaxili laxtalanma tez aradan qaldırılmalıdır.

Əgər qanaxma şiddətli və ya kritik yerdədirsə (məsələn, beyin, mədə-bağırsaq traktında) və ya təcili əməliyyata ehtiyac varsa, əlavə əvəzedici terapiya təyin edilir. Əvəzedici terapiya aparıla bilər:

Trombositopeniyanın korreksiyası üçün trombosit konsentratı (trombositlərin sayının sürətlə azalması və ya trombositlərin sayının  $< 10,000-20,000/\mu\text{l}$  [ $< 10-20 \times 10^9/l$ ] olması halında)

Fibrinogen səviyyəsi sürətlə azaldıqda və ya  $<100$  mq/dL ( $<2,9$   $\mu$ mol/L) olarsa, fibrinogeni (və faktor VIII) əvəz etmək üçün kriopresipitat. Digər laxtalanma amillərinin və təbii antikoagulyantların (antitrombin, C, S və Z zülalları) səviyyəsini artırmaq üçün təzə dondurulmuş plazma.

Heparin venoz tromboz və ya ağciyər emboliyası ilə yavaş inkişaf edən yayılmış damardaxili laxtalanma sindromunun müalicəsində təsirli olur. Heparin adətən əlaqəli qanaxma və ya qanaxma riski ilə sürətlə inkişaf edən yayılmış damardaxili laxtalanma üçün təyin edilmir.

### Preparatlar:

***İnsan antitrombin III*** (*Antithrombine III human*)- infuziya üçün məhlul hazırlamaq üçün liyofilizat, 1000ME/ml

***Heparin*** (*Heparin*) – venadaxili və subkutan yeridilmə üçün məhlul, 5000 ME/ml

***Heparin natrium*** -venadaxili və subkutan yeridilmə üçün məhlul,5000 ME/ml

***Heparin-Fereyn*** (Heparin-Ferein) –inyeksiya üçün məhlul,5000 ME/ml

***Heparin-natrium Braun*** (Heparin-sodium Braun) – venadaxili və subkutan yeridilmə üçün məhlul, 5000 ME/ml

***Dekstran 70*** (Dextran 70)- infuziya üçün məhlul, 6%

***Traksara*** (Traxara) venadaxili yeridilmə üçün məhlul, 50 mq

***Uman Kompleks D.I.*** (Uman Complex D.I.) infuziya üçün məhlul hazırlamaq üçün liyofilizat,500 ME

## Ədəbiyyat

1. Регистр лекарственных средств России.

<https://www.rlsnet.ru/mkb/disseminirovannoe-vnutrisosudistoe-svertyvanie-sindrom-defibrinacii-1483>

2.Справочник MSD. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС)(коагулопатия потребления; синдром дефибринации)

Авторы: Joel L. Moake , MD, Baylor College of Medicine

Проверено/пересмотрено сен 2021

<https://www.msdmanuals.com/ru/профессиональный/гематология-и-онкология/коагуляционные-нарушения,синдром-диссеминированного-внутрисосудистого-свертывания/>