

| | |
|---------------------------------|---|
| Xəstəlik sinifi (XBT-10) | Endokrin sistemin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları (E00-E90) |
|---------------------------------|---|

| | |
|---|-------------------------|
| İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM) | Vaqif Süleymanov |
|---|-------------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------|
| XBT-10 rubrikası | Xəstəliklər |
|-------------------------|--------------------|

| | |
|--------|---------------------------|
| E 23.2 | Şəkərsiz diabet |
| N 25.1 | Şəkərsiz diabet, nefrogen |
| R 63.1 | Polidipsiya |

Şəkərsiz diabet böyrəklərdə suyun və sidik konsentrasiyasının reabsorbsiyasının pozulması nəticəsində yaranan xəstəliklər qrupudur, kliniki olaraq şiddətli susuzluq və ifraz olunan sidiyin həcmnin artması ilə özünü göstərir.

| |
|----------------|
| Müalicə |
|----------------|

Müalicədə istifadə olunan dərmanlar (aktiv maddələr).

Hidroklorotiyazid (Hydrochlorothiazide)

Dekstroza (Dextrose)

Desmopressin (Desmopressin)

İbuprofen (İbuprofen)

İndometazin (İndomehtacin)

Natrium xlor (Sodium chloride)

Ambulator səviyyədə dərman müalicəsi

Müalicənin məqsədləri:

- xəstəliyin klinik əlamətlərinin aradan qaldırılması
- qan elektrolit səviyyəsinin, plazma və sidiyin osmolyasasının normallaşdırılması
- xəstələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması

Nefrogen şəkərsiz diabetin (NŞD) müalicəsində vazopressinin sintetik analoqu ilə tövsiyə olunur - **desmopressin (desmopressin)**

Əsas dərmanların siyahısı (istifadə 100% ehtimalı var)

| Farmakoloji qrup | Dərmanın beynəlxalq adı | Tətbiq üsulu |
|-------------------------|---|---|
| Antidiuretik | - Desmopressin: desmopressin (həblər, liyofilizat) -Desmopressin (0,1 və 0,2 mq həblər) | İlkin doza - adekvat baxım dozası seçilməklə gündə 1 dəfə 60 mq dilin altına. |

Desmopressinin bir formasını digərinə dəyişdirmək lazımdırsa, aşağıdakı təxmini doza çevrilməsindən istifadə edə bilərsiniz: 0,1 mq desmopressin tabletlərinin klinik effektivliyi = 60 mq desmopressinin dilaltı tabletləri.

NŞD -nin müalicəsi tiazid diuretikləri və **qeyri-steroid iltihabəlehinə dərmanlar (QSİƏP)** ilə həyata keçirilir.

Əsas dərmanların siyahısı (100% istifadə ehtimalına malikdir);

| Farmakoloji qrup | Dərmanın beynəlxalq qeyri-mülkiyyət adı | Tətbiq üsulu |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Hidroxlortiyazid | Hidroxlortiyazid | kapsullar, həblər, oral məhlullar |
| QSİƏP-lər | İbuprofen | həblər |
| QSİƏP-lər | İndometasin | həblər |

Cərrahi müdaxilə: yox.

Qeyri-dərman müalicəsi:

Ümumi rejim

Pəhriz: cədvəl № 15

Susuzluq varsa, su istehlakını məhdudlaşdırmayın

Protokolda təsvir edilən diaqnostika və müalicə üsullarının müalicə effektivliyi və təhlükəsizliyinin göstəriciləri

-xəstəliyin klinik əlamətlərinin şiddətinin azalması və ya yox olması:
susuzluq və poliuriya;

-qan elektrolit səviyyəsinin və plazma və sidik osmolyallığının normallaşdırılması.

Sidiyin nisbi sıxlığının tam normallaşmasına nail olmamalısınız.

Ədəbiyyat

Несахарный диабет у взрослых Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2018 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82-%D1%83-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85-2018/16129>