

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	E- Endokrin sistemin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Camalova Ü.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
E61.1	Dəmir çatmamazlığı <i>Çıxarılıb: dəmir defisitli anemiya(D50.-)</i>

Müalicə

Müalicə və profilaktika üçün daxilə 2 valentli dəmir preparatları və ya 3 valentli dəmir preparatları, ən çox dəmir sulfat istifadə olunur.

Dəmir çatışmazlığı anemiyasının müalicəsi üçün optimal dəmir dozası gündə 120 mq, profilaktika üçün - gündə 60 mq təşkil edir.

Uşaqlarda dəmir preparatlarının dozası yaşdan asılıdır və üç yaşa qədər uşaqlarda gündə 3 mq/kq, üç yaşdan yuxarı uşaqlarda gündə 45-60 mq, yeniyetmələrdə 120 mq-a qədərdir.

Müalicə müddəti ilkin dəmir çatışmazlığının dərinliyi ilə müəyyən edilir və 1 aydan 3 aya qədər dəyişə bilər.

Dəmir çatışmazlığı anemiyası olan xəstələrdə müalicə effektiv olarsa, yəni dərman pis təsir edərsə və ya əks göstərişlər olduqda, parenteral 3 valentli dəmir preparatlarının təyin edilməsi tövsiyə olunur.

Ədəbiyyat

Железодефицитная анемия

Версия: Клинические рекомендации РФ 2021 (Россия)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80-%D1%80%D1%84-2021/17027>