

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	F- Psixi pozuntular və davranış pozuntuları
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Yusifova B.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
F45.1.	Differensiasiya olunmuş somatoform pozuntusu
F45.4.	Davamlı somatoform ağrı pozuntusu

Müalicə

Antidepressantlar – SSRI qrupunun preparatlarına (duloksetin, sertralin, fluoksetin, fluvoksamin, mirtazapin, agomelatin*, venlafaksin) üstünlük verilməlidir.

Trankvilizatorlar – təşviş pozuntularını aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulur (diazepam, fenazepam, tofisopam, etifoksin, klonazepam, alprazolam)

Normotimik preparatlar - əhval-ruhiyyəni sabitləşdirmək, bioloji ritmlərdə pozulmalara qarşı dərman nəzarəti (karbamazepin, valproik turşusu, lamotrigin, topiramet) üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kiçik antipsixotiklər - davranış pozuntularının korreksiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur (sulpirid).

* Dərman intihara meyilli olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Əsas dərmanların siyahısı

DV beynəlxalq patentləşdirməmiş adı	Qəbul qaydası
Antidepressanlar və trankvilizatorlar	
Duloksetin (Duloxetine)^{2,3},	60 mq / gün daxilə(per os)

tabletlər	İlkin doza gündə 1 dəfə 60 mq təşkil edir. Böyrək funksiyasının (kreatinin klirensi < 30 ml/dəq) və qaraciyərin ağır pozuntusu ilə: ilkin doza gündə 1 dəfə 30 mq olmalıdır. 18 yaşından.
Agomelatin (Agomelatine)* ^{2,3} , tabletlər	25-50 mq/günə oral x 1 dəfə axşam 18 yaşından
Venlafaksin (Venlafaxine) ^{1,2} , tabletlər	37,5-150 mq/günə oral x 1 dəfə, 150 mq/gün dozada 2 qəbula 18 yaşından.
Amitriptilin (Amitriptyline) ^{2,3} , tabletlər, ampulalar	25-100 mq/günə oral Uşaqlar: 6 yaşdan 12 yaşa qədər - hissə- hissə olaraq 10-30 mq/gün və ya 1-5 mq/kq/gün. yeniyyətə yaşda - gündə 75 mq-a qədər. - gündə 1-4 dəfə
Sertralin ^{2,3} (Sertraline), tabletlər	1-3 qəbula 50-100 mq/gün oral 18 yaşından
Fluvoksamin (Fluvoxamine) ^{2,3} , tabletlər	gecə 50-100 mq/gün oral Uşaqlar: 8 yaşdan - 25-50 mq/gün
Trazodon (Trazodone) ^{1,2} , tabletlər	Gündə 150-300 mq oral 3 qəbula, gündəlik dozanın əsas hissəsini yatmadan əvvəl qəbul etmək tövsiyə olunur. 18 yaşa qədər ehtiyatla.
Mirtazapin (Mirtazapine) ^{1,2} , tabletlər	18 yaşdan etibarən 15-30 mq/gün oral
Fluoksetin (Fluoxetine) ^{1,2,4} , tabletlər	18 yaşdan etibarən 20-60 mq/gün oral 1-3 dəfə
Etifoxin (Etifoxine) ^{1,2} , kapsullar	2-3 qəbula 100-150 mq/gün Müalicə kursu: 18 yaşdan 4-6 həftə.
Diazepam (Diazepam) ^{2,3} , tabletlər	Dozanın fərdi seçimi: gündə 1-3 dəfə 2,5- 10 mq/gün. Kursun müddəti 7-10 gündən çox deyil. 18 yaşdan.
Fenazepam (Phenazepam) ^{1,2,4} , tabletlər	Dozanın fərdi seçimi: daxilə olaraq gündə 0,5-1 mq
Tofisopam (Tofisopam) ^{2,3,4} , gündüz trankvilizatoru	50-100 mq/gün oral 1-3 qəbula 300 mq-a qədər oral
Klonazepam (Clonazepam) ^{1,2,4} , tabletlər	Dozaların fərdi seçimi. 1-2 qəbula gündə 0,5-1 mq.
Alprazolam * (Alprazolam)* ^{1,2,4} , tabletlər	0,125 mq – 2 mq/gün oral olaraq 1-3 qəbula, gündə 4 mq-a qədər 18 yaşından

* Dərman intihara meyilli xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

1 Hamiləlik dövründə əks-göstərişdir

2 Laktasiya dövründə əks-göstərişdir

3. Hamilə qadınlara tətbiqi, əgər fayda potensial riskdən daha çox olarsa, mümkündür

4. Uşaqlarda istifadənin təhlükəsizliyi müəyyən edilməmişdir.

Əlavə dərmanların siyahısı

DV beynəlxalq patentləşdirməmiş adı	Qəbul qaydası
"Kiçik" neyroleptiklər	
Sulpirid (Sulpiride), tabletlər, kapsullar	. Dozaların fərdi seçimi. 200-400 mq/gün oral olaraq 2-3 qəbula. Uşaqlar: 6 yaşdan yuxarı 5 mq/kq/gün. Hamilə qadınlarda və laktasiya dövründə ehtiyatla istifadə edin
Amisulpirid (Amisulpride)	Dozaların fərdi seçimi.. 50-600 mq/gün oral olaraq 1-3 qəbula Uşaqlar: 15 yaşdan yuxarı 50-300 mq/gün 1-3 qəbula
Risperidon (Risperidone)	Dozaların fərdi seçimi. 0,5-6 mq/gün oral Uşaqlar: 5 yaşdan. bədən çəkisi 50 kq-dan az - 0,25-0,75 mq/gün; 50 kq-dan çox - 0,25-2 mq/gün
Normotimik preparatlar	
Topiramət ^{1,2} (Topiramate), tabletlər, kapsullar	Dozaların fərdi seçimi. 50-150 mq/gün oral 1-3 qəbula Uşaqlar: 6 yaşdan yuxarı 25-100 mq/gün 1-3 qəbula
Karbamazepin (Carbamazepine) ^{2,3} , tabletlər	Dozaların fərdi seçimi. 200-600 mq/gün oral – 1-3 qəbula Uşaqlar: 6 yaşa qədər - gündə 2-3 dəfə 1 kq bədən çəkisi üçün 10-20 mq. 6-12 yaş - gündə 2 dəfə 100 mq. 12 yaşdan yuxarı - 100-400 mq/gün - gündə 2-3 dəfə
Valproik turşu (Valproic Acid) ^{1,2}	Dozaların fərdi seçimi. 1-3 qəbula 300-600 mq/gün oral Uşaqlar: 17 kq-dan çox - 1-3 qəbula 30 mq/kq/gün

Lamotrigin (Lamotrigine) ^{1,2} , tabletlər	Dozaların fərdi seçimi. 50-100 mq/gün oral 18 yaşından.
---	---

* Dərman intihara meyilli xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

1 Hamiləlik dövründə əks-göstərişdir

2 Laktasiya dövründə əks-göstərişdir

3. Hamilə qadınlara təyini, əgər fayda potensial riskdən daha çox olarsa, mümkündür

4 Uşaqlarda istifadənin təhlükəsizliyi müəyyən edilməmişdir.

Ədəbiyyat

Невротические, связанные со стрессом, соматоформные расстройства

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2018 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5->

[%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE-](https://diseases.medelement.com/disease/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BE-)

[%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC-](https://diseases.medelement.com/disease/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC-)

[%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-](https://diseases.medelement.com/disease/%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-)

[%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2018/16012](https://diseases.medelement.com/disease/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-2018/16012)