

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>F- Psixi pozuntular və davranış pozuntuları</b>
---------------------------------	--

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Yusifova B.</b>
---	--------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>F44.0.</b>	Dissosiativ amneziya
<b>F44.1.</b>	Dissosiativ fuqa
<b>F44.2.</b>	Dissosiativ stupor
<b>F44.3.</b>	Trans və mübtəlaliq
<b>F44.4.</b>	Dissosiativ hərəkət pozuntuları
<b>F44.5.</b>	Dissosiativ konvulsiyalar
<b>F44.6.</b>	Dissosiativ anesteziya və ya hissi qavramanın itirilməsi
<b>F44.7.</b>	Qarışıq dissosiativ (konversion) pozuntular

## **Müalicə**

Antidepressantlar – SSRI qrupunun preparatlarına (duloksetin, sertralin, fluoksetin, fluvoksamin, mirtazapin, agomelatin\*, venlafaksin) üstünlük verilməlidir.

Trankvilizatorlar – təşviş pozuntularını aradan qaldırmaq üçün nəzərdə tutulur (diazepam, fenazepam, tofisopam, etifoksin, klonazepam, alprazolam)

Normotimik preparatlar - əhval-ruhiyyəni sabitləşdirmək, bioloji ritmlərdə pozulmalara qarşı dərman nəzarəti (karbamazepin, valproik turşusu, lamotrigin, topiramet) üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kiçik antipsixotiklər - davranış pozuntuların korreksiyai üçün nəzərdə tutulmuşdur (sulpirid).

\* Dərman intihara meyilli olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

### Əsas dərmanların siyahısı

DV beynəlxalq patentləşdirməmiş adı	Qəbul qaydası
<b>Antidepressanlar və trankvilizatorlar</b>	
<b>Duloksetin</b> (Duloxetine) <sup>2,3</sup> , tabletlər	60 mq / gün daxilə(per os) İlkin doza gündə 1 dəfə 60 mq təşkil edir. Böyrək funksiyasının (kreatinin klirensi<30 ml/dəq) və qaraciyərin ağır pozuntusu ilə: ilkin doza gündə 1 dəfə 30 mq olmalıdır. 18 yaşından.
<b>Agomelatin</b> (Agomelatine) <sup>*2,3</sup> , tabletlər	25-50 mq/günə oral x 1 dəfə axşam 18 yaşından
<b>Venlafaksin</b> (Venlafaxine) <sup>1,2</sup> , tabletlər	37,5-150 mq/günə oral x 1 dəfə, 150 mq/gün dozada 2 qəbula 18 yaşından.
<b>Amitriptilin</b> (Amitriptyline) <sup>2,3</sup> , tabletlər, ampulalar	25-100 mq/günə oral Uşaqlar: 6 yaşdan 12 yaşa qədər - hissə- hissə olaraq 10-30 mq/gün və ya 1-5 mq/kq/gün. yeniyyətə yaşda - gündə 75 mq-a qədər. - gündə 1-4 dəfə
<b>Sertralin</b> <sup>2,3</sup> (Sertraline), tabletlər	1-3 qəbula 50-100 mq/gün oral 18 yaşından
<b>Fluvoksamin</b> (Fluvoxamine) <sup>2,3</sup> , tabletlər	gecə 50-100 mq/gün oral Uşaqlar: 8 yaşdan - 25-50 mq/gün
<b>Trazodon</b> (Trazodone) <sup>1,2</sup> , tabletlər	Gündə 150-300 mq oral 3 qəbula, gündəlik dozanın əsas hissəsini yatmadan əvvəl qəbul etmək tövsiyə olunur. 18 yaşa qədər ehtiyatla.
<b>Mirtazapin</b> (Mirtazapine) <sup>1,2</sup> , tabletlər	18 yaşdan etibarən 15-30 mq/gün oral
<b>Fluoksetin</b> (Fluoxetine) <sup>1,2,4</sup> , tabletlər	18 yaşdan etibarən 20-60 mq/gün oral 1-3 dəfə
<b>Etifoxin</b> (Etifoxine) <sup>1,2</sup> , kapsullar	2-3 qəbula 100-150 mq/gün Müalicə kursu: 18 yaşdan 4-6 həftə.

<b>Diazepam</b> (Diazepam) <sup>2,3</sup> , tabletlər	Dozanın fərdi seçimi: gündə 1-3 dəfə 2,5-10 mq/gün. Kursun müddəti 7-10 gündən çox deyil. 18 yaşdan.
<b>Fenazepam</b> (Phenazepam) <sup>1,2,4</sup> , tabletlər	Dozanın fərdi seçimi: daxilə olaraq gündə 0,5-1 mq
<b>Tofisopam</b> (Tofisopam) <sup>2,3,4</sup> , gündüz trankvilizatoru	50-100 mq/gün oral 1-3 qəbula 300 mq-a qədər oral
<b>Klonazepam</b> (Clonazepam) <sup>1,2,4</sup> , tabletlər	Dozaların fərdi seçimi. 1-2 qəbula gündə 0,5-1 mq.
<b>Alprazolam</b> * (Alprazolam) <sup>*1,2,4</sup> , tabletlər	0,125 mq – 2 mq/gün oral olaraq 1-3 qəbula, gündə 4 mq-a qədər 18 yaşından

\* Dərman intihara meyilli xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

1 Hamiləlik dövründə əks-göstərişdir

2 Laktasiya dövründə əks-göstərişdir

3. Hamilə qadınlara tətbiqi, əgər fayda potensial riskdən daha çox olarsa, mümkündür

4. Uşaqlarda istifadənin təhlükəsizliyi müəyyən edilməmişdir.

#### Əlavə dərmanların siyahısı

DV beynəlxalq patentləşdirməmiş adı	Qəbul qaydası
<b>"Kiçik" neyroleptiklər</b>	
<b>Sulpirid</b> (Sulpiride), tabletlər, kapsullar	. Dozaların fərdi seçimi. 200-400 mq/gün oral olaraq 2-3 qəbula. Uşaqlar: 6 yaşdan yuxarı 5 mq/kq/gün. Hamilə qadınlarda və laktasiya dövründə ehtiyatla istifadə edin
<b>Normotimik preparatlar</b>	
<b>Topiramet</b> <sup>1,2</sup> , tabletlər, kapsullar	Dozaların fərdi seçimi. 50-150 mq/gün oral 1-3 qəbula Uşaqlar: 6 yaşdan yuxarı 25-100 mq/gün 1-3 qəbula
<b>Karbamazepin</b> (Carbamazepine) <sup>2,3</sup> , tabletlər	Dozaların fərdi seçimi. 200-600 mq/gün oral – 1-3 qəbula Uşaqlar: 6 yaşa qədər - gündə 2-3 dəfə 1 kq bədən çəkisi üçün 10-20 mq. 6-12 yaş - gündə 2 dəfə 100 mq. 12 yaşdan yuxarı - 100-400 mq/gün - gündə 2-3 dəfə
<b>Valproik turşu</b> (Valproic	Dozaların fərdi seçimi.

Acid) <sup>1,2</sup>	1-3 qəbula 300-600 mq/gün oral Uşaqlar: 17 kq-dan çox - 1-3 qəbula 30 mq/kq/gün
<b>Lamotrigin</b> (Lamotrigine) <sup>1,2</sup> , tabletlər	Dozaların fərdi seçimi. 50-100 mq/gün oral 18 yaşından.

\* Dərman intihara meyli xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

1 Hamiləlik dövründə əks-göstərişdir

2 Laktasiya dövründə əks-göstərişdir

3. Hamilə qadınlara təyini, əgər fayda potensial riskdən daha çox olarsa, mümkündür

4 Uşaqlarda istifadənin təhlükəsizliyi müəyyən edilməmişdir.

## Ədəbiyyat

Реакция на стресс Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2017  
(Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-2017/15428>