

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Xəstəlik sinifi (XBT-10) | G - Sinir sistemi xəstəlikləri |
|---------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|---|---------------------|
| İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM) | Məmmədova A. |
|---|---------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| XBT-10 rubrikası | Xəstəliklər |
| G71.0 | Əzələ distrofiyası: <ul style="list-style-type: none"> • Düşən və ya Bekker distrofiyasına bənzər uşaq tipli autosom ressesiv • xoşxassəli [Bekker] |

Müalicə

Qeyri-medikamentoz müalicə:

- Pəhriz - zülallarla, vitaminlərlə (B, D, C), mikroelementlərlə (kalsium) zənginləşdirilmiş;
- hormonal terapiyaya başlamazdan əvvəl peyvənd cədvəlinə uyğun olaraq **immunizasiya məcburidir**; hormonal terapiyası qəbul edərkən inaktivləşdirilmiş (öldürülmüş) vaksinlərlə immunizasiyaya icazə verilir; Hormonal terapiya qəbul edərkən diri vaksinlərə immunizasiyadan çəkinmək lazımdır;
- vəziyyətə və xəstəliyin mərhələsinə adekvat olan fiziki fəaliyyət (nəzarət altında)

Medikamentoz müalicə

Əsas dərman preparatları:

| Farmakoterapevtik qrup | Preparatın beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı | İstifadə qaydası |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| Qlükokortikosteroidlər | Prednizolon - tablet 5 mq | Gündəlik doza 0,75 mq/kq, |

| | | |
|--|---|---|
| | | gündəlik səhərlər qəbul edilir, daxilə |
| | Deflazakort – tablet 6 mq, 30 mq | Gündəlik doza 0,9 mq/kq, gündəlik səhərlər qəbul edilir, daxilə |

Əlavə dərman preparatları:

| Farmakoterapevtik qrup | Preparatın beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı | İstifadə qaydası |
|--|---|---|
| Sümük-əzələ sistemi. Sümük-əzələ sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün digər dərmanlar. | Ataluren - qranullar, paketlər: 125, 250, 1000 mq | Gündəlik doza 40 mq/kq, 3 dəfəyə qəbul olunur: səhər 10 mq/kq, günorta 10 mq/kq, axşam 20 mq/kq, daxilə (konsilium tərəfindən təyin edilir) |
| Sümük-əzələ sistemi. Sümük-əzələ sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün digər dərmanlar. | Eteplirsən – v/d yeridilmə üçün məhlul, 50 mq/ml, ampulalar: 500 mq/10 ml, 100 mq/2 ml | Gündəlik doza 30 mq/kq, venadaxili damcı üsulu ilə, həftədə bir dəfə, infuziya müddəti 35-60 dəqiqədir (konsilium tərəfindən təyin edilir) |
| Sümük-əzələ sistemi. Sümük-əzələ sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün digər dərmanlar. | Golodirsən – v/d yeridilmə üçün məhlul, 50 mq/ml ampulalar: 100 mq/2 ml | Gündəlik doza 30 mq/kq, venadaxili damcı üsulu ilə, həftədə bir dəfə, infuziya müddəti 35-60 dəqiqədir (konsilium tərəfindən təyin edilir) |
| Vitamin | Xolekalsiferol (vitamin D3) - ağızdan tətbiq üçün sulu məhlul, yağlı məhlul daxilə; kapsul və tabletlər 0,25, 0,5, 1,0 mkq; v/d tətbiq üçün məhlul 2 mkq/1,0 ml və 5 | Gündəlik doza 1000-5000 BV, gündə 1 dəfə, daxilə, payız-qış dövründə və ya daimi olaraq qəbul edilir |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | mkq/1,0 ml. | |
| Kalsium preparatları | Kalsium preparatları , digər preparatlarla birlikdə kalsium preparatları - tabletlər | Gündəlik doza 2-3q. 2-3 dəfəyə, kurs 1-2 aydır |

| | |
|------------------|--|
| Ədəbiyyat | |
|------------------|--|

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BF-%D1%80%D0%BA-2021/16654>

- Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера
Клинические протоколы МЗ РК - 2021 (Казахстан)

<https://www.pediatr-russia.ru/news/%D0%9A%D0%A0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A1%D0%9F%D0%A0.pdf>

- Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна.
Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера.
Клинические рекомендации. 2023