

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	G - Sinir sistemi xəstəlikləri
---------------------------------	---------------------------------------

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Məmmədova A.
---	---------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
G73.3	Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə miastenik sindromlar
G73.4	Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksiyon və parazitər xəstəliklərdə miopatiya
G73.5	Endokrin xəstəliklərdə miopatiya Miopatiya: <ul style="list-style-type: none"> •hiperparatireozda (E21.0–E21.3†) •hipoparatireozda (E20.–†) Tireotoksik miopatiya (E05.–†)
G73.6	Maddələr mübadiləsi pozğunluğu zamanı miopatiya Miopatiya: <ul style="list-style-type: none"> •qlikogenin toplanma (mübadilə) pozğunluğunda (E74.0†) •lipidlərin toplanma(mübadilə) pozğunluğunda (E75.–†)
G73.7	Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə miopatiya Miopatiya <ul style="list-style-type: none"> • revmatoid artritdə (M05–M06†) • sklerodermiyada (M34.8†) • Şeqren sindromunda (M35.0†) • sistemli qırmızı qurdeşənəyində (M32.1†)

Müalicə

Qeyri-medikamentoz müalicə:

- Fizioterapiya:

- zədələnmiş əzələlər nahiyəsinə **elektroforez** proserin, kalium, kalsium xloridlə No 10.
- **Ultrabənövşəyi şüalanma, ultrasəs** hidrokortizon ilə böyrəküstü vəziləri nahiyəsinə No 6-10.
- Müalicəvi bədən tərbiyəsi

Böyükləri müalicəsi

Medikamentoz müalicə

- Antixolinesteraz preparatları:

Piridostigmin bromid (Pyridostigmine bromide) – Tabletlər 60 mq, 0,5%-li məhlul 1 ml (5 mq) ampulada; və ya **Neostigmin metilsulfat** (Neostigmine methylsulphate) - tabletlər 15 mq, 0,05%-li məhlul 1 ml (0,5 mq) ampulada

Müalicə kifayət qədər effektiv olmadıqda qlükokortikoidlər təyin edilir:

- **Prednizolon** (Prednisolone) orta hesabla 1 mq/kq/gün dozada, lakin 50 mq-dan az olmayaraq. Ciddi kəskinləşmə zamanı hər gün səhər 60-150 mq/gün təyin edilir, 5-7 gündən sonra (müalicə effekti əldə olunana qədər) bir gündən bir sxeminə keçirlər. Xəstələrin vəziyyəti yaxşılaşdıqca, prednizolonun dozası tədricən saxlayıcı dozaya endirilir: günəşırı 20-30 mq/gün, uzun müddət qəbul edilir (bir neçə ay və ya hətta illər).

Uçaqların müalicəsi

- Antixolinesteraz preparatları:

Piridostigmin bromid (Pyridostigmine bromide) – 30-60 mq, daxilə gündə 3-5 dəfə, maksimal gündəlik doza 360 mq-dır.

- **Qlükokortikosteroidlər** (göstərişə görə):

Prednizolon (Prednisolone) tabletlər 5 mq, doza 1–1,5 mq/kq/gün **və ya metilprednizalon** (methylprednisolon) (tabletlər 4 mq, 8 mq, 16 mq и 32 mq) 0,8–1,2 mq /kq/gün dozada daxilə tədricən gündəlik dozanı saxlayıcı dozaya qədər azaldaraq və ya tam dayandıraraq.

http://www.grsmu.by/files/file/university/cafedry/nevrologii/files/lf/klin_protokol.pdf

- Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями нервной системы (взрослое население)»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
2018год

https://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/CProtokol/%D0%9A%D0%9F_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%97_12.04.2023_53.pdf

- Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями нервной системы (детское население)»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
12.04.2023