

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	G - Sinir sistemi xəstəlikləri
---------------------------------	---------------------------------------

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Konul İsmayılova
-------------------------------------------	-------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
G80.0	Kvadroplegik spastik serebral iflic
G80.1	Kvadroplegik spastik serebral iflic
G80.2	Hemiplegik spastik serebral iflic
G80.4	Ataksik serebral iflic
G80.8	Serebral iflicin digər növü

Müalicə

AbobotulinumtoxinA (Dysport)

OnabotulinumtoxinA (Botox)

Diazepam

Valproy turşusu

Baclofen

Tizanidin

AMBULATOR MÜALİCƏ

OnabotulinumtoxinA-nın müəyyən edilmiş ümumi bədən dozası 12 U/kq, hər ziyarət üçün maksimum 400 U ilə məhdudlaşır. (Lakin bir çox təcrübələr 20 U/kq-dan maksimum 600 U-ya qədər etibarlı şəkildə istifadə edilmişdir). Hər kiçik əzələ 1-2 U/kq, böyük əzələlər isə 4-6 U/kq qəbul edir.

Sonrakı botulinum toksini prosedurlarını daha az effektiv edə biləcək anticisim əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün dozalar arasında interval ən azı 4 ay olmalıdır. Nəzərə alın ki, böyük əzələlər bu məhdudlaşdırıcı dozaya cavab

verməyə bilər və ya tez-tez xəstələrə hər səfərdə bir neçə əzələnin işlənməsi lazımdır.

Antikonvulsantlar (benzodiazepinlər diazepam, valproat turçusu və barbituratlar)

Neyrocərrahi və ortopedik cərrahiyyə

Ədəbiyyat

Cerebral Palsy Treatment & Management

Updated: Aug 22, 2018

<https://emedicine.medscape.com/article/1179555-treatment#d8>