

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	Gözün və gözün əlavə aparatının xəstəlikləri
---------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Məmmədova L.
---	---------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
H04.2	Epifora
H04.3	Göz yaşı axacaqlarının kəskin və dəqiqləşdirilməmiş iltihabı
H04.4	Göz yaşı axacaqlarının xroniki iltihabı
H04.5	Göz yaşı axacaqlarının stenozu və çatmamazlığı
H04.6	Göz yaşı axacaqlarının digər dəyişiklikləri

Müalicə

Konservativ müalicə (tibbi göstərişə görə):

Antibakterial preparatlar:

Xloramfenikol (Chloramphenicol), məhlul (göz damcıları) 2,5 mq/ml və ya

Tobramisin (Tobramycin), məhlulu (göz damcıları) 3 mq/ml və ya

Siprofloksasin (Ciprofloxacin), məhlul (göz damcıları) 3 mq/ml və ya

Gentamisin (Gentamicin), məhlul (göz damcıları) 3 mq/ml və ya

Levofloksasin (Levofloxacin), məhlul (göz damcıları) 5 mq/ml və ya

Ofloksasin (Ofloxacin), məhlul (göz damcıları) 3 mq/ml:

1-2 damcı gündə 4-6 dəfə, 7-14 gün və ya

Sulfasetamid (Sulfacetamide), məhlul (göz damcıları) 200 mq/ml, 300

mq/ml: 3-5 gün ərzində gündə 3-8 dəfə 1-2 damcı, tibbi göstərişlərə görə

qəbulu 4-6 həftəyə gədər uzadıla bilər;

Antiseptik və dezinfeksiyaedici preparatlar:

Benzildimetil-miristoylamino-propilammonium (Benzyldimethyl-

myristoilamin-propylammonium) - Miramistin (Miramistin), Septomirin,

məhlul (göz damcıları) 0,1 mq/ml: 7-14 gün ərzində gündə 3 dəfə 1-2 damcı;

Antiallergik preparatlar:

Kromoglikik turşu (Cromoglicic acid), məhlul (göz damcıları) 20 mq/ml, 40 mq/ml: gündə 2 dəfə 1 damcı, 14-30 gün;
müalicə müddəti xəstənin klinik vəziyyətindən asılı olaraq müəyyən edilir;

İltihab əleyhinə preparatlar:

Qlükokortikoid preparatlar:

Deksametazon (Dexamethasone), məhlul və ya suspenziya (göz damcıları) 1 mq/ml: 1-2 damcı gündə 3-5 dəfə 7-14 gün və ya

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar:

Diklofenak (Diclofenac), məhlul (göz damcıları) 1 mq/ml: 1-2 damcı 7-14 gün ərzində gündə 3-4 dəfə və ya

Ketorolak (Ketorolac), məhlul (göz damcıları) 5 mq / ml: 7-14 gün ərzində gündə 3 dəfə 1-2 damcı;

Eyni vaxtda antibakterial və iltihab əleyhinə terapiya üçün göz damcılarının sabit birləşmələrinin istifadəsi:

Tobramisin/Deksametazon (Tobramycin/ Dexamethasone), məhlul (göz damcıları) 3 mq/1 mq/ml: 7 gün ərzində gündə 3-4 dəfə 1-2 damcı və ya

Framisetin/Qramisetin/Deksametazon (Framycetinum + Gramicidinum + Dexamethasone), məhlul (göz və qulaq damcıları) 5 mq/0,05 mq/0,5 mq/ml: 7 gün ərzində gündə 3-6 dəfə 1-2 damcı;

Cərrahi müdaxilə (tibbi göstərişə görə).

Ədəbiyyat

Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с болезнями глаза и его придаточного аппарата» (утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.09.2022 № 91)

https://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/CProtokol/%D0%9A%D0%9F_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%B7%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D

0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D
0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1
%82_%D0%9C%D0%97_05.09.2022_91.pdf