

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>Gözün və gözün əlavə aparatının xəstəlikləri (H00-H59)</b>
-------------------------------------	---

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Əlizadə İ.</b>
---	-------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	
<b>H33.0</b>	<b>Tor qişanın cırılma ilə qopması</b> Tor qişanın cırılma nəticəsində qopması
<b>H33.1</b>	<b>Retinoşizis və retinal kistalar</b> Dişli kənarın (ora serrata) kistası Tor qişanın ƏGO parazitar kistası Tor qişanın psevdokistası <b>Çıxarılıb:</b> anadangəlmə retinoşizis (Q14.1) tor qişanın mikrokistoz degenerasiyası(H35.4)
<b>H33.2</b>	<b>Tor qişanın seroz qopması</b> Tor qişanın qopması: • ƏGO • tor qişanın cırılması olmadan <b>Çıxarılıb:</b> mərkəzi serozlu xorioretinopatiya (H35.7)
<b>H33.4</b>	<b>Tor qişanın traksion qopması</b> Tor qişanın qopması ilə proliferativ vitreoretinopatiya

## **Müalicə**

**Konservativ müalicə** (tibbi göstərişlərə əsasən):

**1. İltihab əleyhinə d/v:**

**Qlükokortikoid d/v:**

**Deksametazon**, məhlul və ya suspenziya (göz damcısı) 1 mq/ml, 1-2 damcı gündə 3-5 dəfə 14-30 gün ərzində, və (və ya)

**Hidrokortizon**, göz məlhəmi 5 mq/q – aşağı göz qapağının selikli qişasına 1,5 sm uzunluqda məlhəm zolaqları qoyulur 3 dəfə gündə 14-30 gün ərzində, müalicə müddəti xəstənin klinik vəziyyəti ilə müəyyən edilir; və/və ya QSiƏP-lər:

**Diklofenak**, məhlul (göz damcıları) 1 mq/ml 1-2 damcı gündə 3-4 dəfə 14-30 gün və ya

**Ketorolak**, məhlul (göz damcıları) 5 mq/ml 1-2 damcı gündə 3 dəfə 14-30 gün;

**2. Midriatik və siklopleqik dərman vasitələri** –sikloplegiya üçün:

**Atropin**, məhlul (göz damcıları) 10 mq/ml 5 ml, 0,5-3 ay ərzində 1 damcı gündə 1-2 dəfə və (və ya)

**Tropikamid**, məhlul (göz damcıları) 10 mq/ml 10 ml, 1-2 damcı 0,5-1 ay ərzində gündə 1-3 dəfə və ya

**Fenilefrin**, məhlul (göz damcısı) 50 mq/ml 10 ml, 1 damcı gündə 1-2 dəfə 0,5-1 ay;

**3. Antiallerqik d/v:**

**Kromoqlik turşusu**, məhlul (göz damcısı) 20 mq/ml 10 ml, 40 mq/ml 5 ml, 7-10 gün ərzində 1-2 damcı gündə 3-5 dəfə;

**4. Sidikqovucu dərmanlar** - retinanın eksudativ qopması zamanı:

**Furosemid**, 40 mq tabletlər, daxilə 2-4 gün ərzində 1 tablet gündə 1 dəfə və ya

**Asetazolamid**, 250 mq tablet, daxilə 1 tablet gündə 1 dəfə 2-4 gün ərzində;

**5. Diqər oftalmoloji d/v-** gözün strukturlarında müşayiət olunan degenerativ-distrofik dəyişikliklər zamanı:

**Emoksipin**, inyeksiya üçün məhlul 30 mq/ml 5 ml, 10 ml, ə/d 5 ml və ya v/d 10 ml gündə 1 dəfə 7-10 gün və (və ya)

**Emoksipin**, inyeksiya üçün məhlul 10 mq/ml 1 ml, parabolbar və ya subkonyuktival 0,5 ml 7-10 gün və (və ya)

**Emoksipin**, məhlul (göz damcıları) 10 mq/ml 5 ml, 1 ay ərzində 1-2 damcı gündə 3-4 dəfə və (və ya)

**Dekspantenol**, oftalmoloji gel 50 mq/q, 1 damcı gündə 2-3 dəfə 7-21 gün, müalicə müddəti xəstənin klinik vəziyyətinə görə müəyyən edilir.

**Cərrahi müdaxilə** (tibbi göstərişlərə əsasən)

## ӘДӘБИҰАТ:

1. Диагностика и лечение пациентов с болезнями глаза и его придаточного аппарата (взрослое население). Клинические протоколы 2022 (Беларусь). (утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.09.2022 № 91) Available from: <https://ref.az/ztE4rD>
2. Постановление министерства здравоохранения Республики Беларусь (5 сентября 2022 г. № 91) Об утверждении клинического протокола «Диагностика и лечение пациентов с болезнями глаза и его придаточного аппарата (взрослое население)». Available from: <https://ref.az/2S5EaVC>