

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>I Qan dövranı sisteminin xəstəlikləri</b>
-------------------------------------	--

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Əlizadə İ.</b>
---	-------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	
<b>I 65.0.</b>	<b>Fəqərə arteriyasının tıxanması və stenozu</b>
<b>I65.2.</b>	<b>Yuxu arteriyasının tıxanması və stenozu</b>
<b>I65.3.</b>	<b>Çoxsaylı və ikitərəfli beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu</b>
<b>I65.8.</b>	<b>Digər beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu</b>
<b>I67.2.</b>	<b>Serebral ateroskleroz</b>
<b>I67.7.</b>	<b>Digər rubrikalarda təsnif olunmayan beyin (serebral) arteriiti</b>
<b>I72.0.</b>	<b>Yuxu arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması</b>
<b>I72.1.</b>	<b>Yuxarı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması</b>
<b>I74.2.</b>	<b>Yuxarı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu</b>
<b>I74.8.</b>	<b>Digər arteriyaların emboliya və trombozu</b>
<b>I77.8.</b>	<b>Arteriyalar və arteriolaların digər dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri</b>

## **Müalicə**

### **MÜALİCƏ TAKTİKASI**

**Müalicənin məqsədləri:**

· birincili və ya ikincil insultun inkişafının qarşısının alınması.

### **Qeyri-medikamentoz müalicə**

Rejim - I, II, III;

Pəhriz - №10.

### **Medikamentoz müalicə:**

Hipolipidemik terapiya (statinlər) (dərman seçimi həkimin ixtiyarındadır) (B):

- **lovastatin** 20-80 mq gündə 1 dəfə daxilə;
- **atorvastatin** 10 və 20 mq gündə 1 dəfə daxilə;
- **pravastatin** 10 və 20 mq gündə 1 dəfə daxilə;
- **simvastatin** 10-20 mq, daxilə gündə 1 dəfə, 80 mq/günə qədər artırıla bilər;
- **fluvastatin**: 20-40 mq (80 mq-a qədər) gündə 1 dəfə daxilə.

Hipolipidemik terapiya qanda ümumi xolesterinin səviyyəsindən asılı olaraq 4-6 aydan 1 ilə qədər müddətə təyin edilir.

Antiaqreqant terapiya (dərman seçimi həkimin ixtiyarındadır):

- **asetilsalisil turşusu** həbləri 100 mq, 150 mq gündə 1 dəfə daxilə (A);
- **dipiridamol** 25 mq, 75 mq gündə 1 dəfə daxilə (B);
- **klopidoqrel** 75 mq, 300 mq gündə 1 dəfə daxilə (B);

Antiaqreqant terapiya uzun müddətə təyin edilir (əks göstərişlər olmadıqda, dərmanların istifadəsi ömürlükdür), dərmanın qəbulunun tezliyi və müddəti xəstənin bədən çəkisindən, laboratoriya parametrlərindən və s.

**Müalicə zamanı istifadə edilən dərmanlar (aktiv maddələr):**

**Atorvastatin (Atorvastatin)**

**Asetilsalisil turşusu (Acetylsalicylic acid)**

**Dipiridamol (Dipyridamole)**

**Klopidoqrel (Clopidogrel)**

**Lovastatin (Lovastatin)**

**Pravastatin (Pravastatin)**

**Simvastatin (Simvastatin)**

**Fluvastatin (Fluvastatin)**

## **ӘДӘБИҮҮАТ:**

Экстракраниальные заболевания брахиоцефальных артерий.  
Республиканский центр развития здравоохранения. Клинические  
протоколы МЗ РК - 2015 (Казахстан). Available from: <https://ref.az/3tNMXt8>