

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	I - Qan dövranı sisteminin xəstəlikləri
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Abasova İ.
---	-------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
I33.0	Kəskin və yarımkəskin infeksiyon endokardit
I38	Endokardit, qapaq dəqiqləşdirilmədən
I39*	Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə edilən endokardit və ürək qapaqlarının zədələnmələri
I39.8*	Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə olunan, qapaq dəqiqləşdirilmədən endokardit

Müalicə

Cədvəl

Əsas dərman vasitələrinin siyahısı (100% istifadə ehtimalı ilə):

Farmakoterapevtik qrup	D/v BQPA	Tətbiq üsulu, dozası
	Benzilpenisilin natrium duzu	Yetkinlər: 250.000-500.000 V hər 6 saatdan bir; gündəlik doza 1.000.000-

b-laktamlar		<p>2.000.000 V; maksimal - sutkada – 40.000.000-60.000.000 V v/d 1 yaşa qədər uşaqlar: 50.000-100.000 V/kq/gün; 1 yaşdan yuxarı uşaqlar:50.000 V / kq / gün; ağır infeksiyalarda 200.000-500.000 V / kq / gün. Sutkalıq doza 4- 6 inyeksiya üçün bölünür.</p>
	Ampisillin	<p>Böyüklər: 2 q v/d hər 4 saatdan bir Uşaqlar: 1 ay və ya daha böyük uşaqlar. 300-400 mq/kq/gün v/d hər 4 saatdan bir. Maksimum doza: 12 q/gün 1 yaş və ya daha böyük: 200-300 mq/kq/gün v/d, hər 4-6 saatdan bir bölünür. Maksimum doza: 12 q/gün Müalicə müddəti: ən azı 4-8 həftə</p>
	Sefazolin	<p>Böyüklər. Hər 6 saatdan bir 1-1,5 q v/d və ya hər 8 saatdan bir 2 q v/d Uşaqlar. 1 ay və ya daha çox: 100 mq/kq/gün v/d və ya ə/d 3 və ya 4 bölünmüş dozada. 1 yaş və ya daha çox: 100 mq/kq/gün v/d bölünmüş dozalarda</p>

		hər 8 saatdan bir Maksimum doza: 12 q/gün Müalicə müddəti: ən azı 4-6 həftə
--	--	---

Əlavə dərmanların siyahısı (istifadə ehtimalı 100%-dən az):

Farmakoterapevtik qrup	D/v BQPA	Tətbiq üsulu, dozası
b-laktamlar	Amoksisilin / klavulanat	Böyüklər. İnfeksiyanın ağırlığından asılı olaraq hər 8 saatdan bir 1000 mq/100 mq və ya hər 12 saatdan bir 2000/200 mq təyin edilir. Çox ağır infeksiyalar üçün doza hər 8 saatdan bir 2000 mq/200 mq-a qədər artırıla bilər. Çəkisi 40 kq-dan az olan uşaqlar 3 aylıq və daha böyük uşaqlar: Təvsiyə olunan doza hər 8 saatdan bir kiloqram bədən çəkisi üçün 25 mq/5 mq təşkil edir. 3 aydan kiçik və ya çəkisi 4 kq-dan az olan uşaqlar: hər 12 saatdan bir kiloqram bədən çəkisi üçün 25 mq/5 mq.
Sulfanilamidlər	Ko-trimoksazol	Böyüklər. Sulfometoksazol 4800 mq/gün trimetoprim 960 mq/gün (v/d 4-6 inyeksiya) Uşaqlar. Sulfometoksazol 60 mq/kq/gün və trimetoprim 12 mq/kq/gün (v/d 2 dozada)

v/d venadaxili

Ədəbiyyat:

Острый и подострый эндокардит (инфекционный эндокардит) 2019.
Available from: <https://ref.az/7ac3nv>