

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	I - Qan dövranı sisteminin xəstəlikləri
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Abasova İ.
---	-------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
I08.8	Digər çoxsaylı qapaq xəstəlikləri
I08.3	Mitral, aorta və trikuspid qapaqların birləşmiş zədələnmələri
I09.8	Digər təyin olunmuş revmatik ürək xəstəlikləri
I25.5	İşemik kardiomiopatiya
I34.0	Mitral (klapan) çatışmazlığı
I42.0	Genişlənmiş kardiomiopatiya
I42.1.	Obstruktiv hipertrofik kardiomiopatiya
I42.2.	Digər hipertrofik kardiomiopatiya
I42.5.	Digər məhdudlaşdırıcı kardiomiopatiya
I42.6.	Alkoqol kardiomiopatiyası
I42.7.	Dərman maddələri və digər xarici amillərin təsirindən əmələ gələn kardiomiopatiya
I42.8.	Digər kardiomiopatiyalar
I42.9	Kardiomiopatiya, dəqiqləşdirilməmiş
I09.1	Revmatik endokardial xəstəliklər, qapaq təyin olunmamış
I09.0	Revmatik miokardit
I50	Ürək çatışmazlığı
I08.0	Mitral və aorta qapaqlarının birləşmiş zədələnməsi
I08.2	Aorta və trikuspid qapaqların birləşmiş zədələnməsi
I08.1	Mitral və trikuspid qapaqların birləşmiş zədələnməsi
I33.0	Kəskin və yarımkəskin infeksiyon endokardit

Müalicə

Əsas dərmanların siyahısı:

Revmatik qızdırmanın qarşısının alınması			
Seçilən dərmanlar			
Dərman	Dozası	Davamiyyət müddəti	SD*
<i>Penisillin (Penicillin)</i>	1,2 mln V ə/d birdəfəlik	hər 4 heftədən bir (ayda bir dəfə)	A
<i>Amoksisillin (Amoxicillinum)</i>	1,5 q x 3 dəfə / gündə	10 gün	A
Beta-laktam antibiotiklərinə qarşı dözümsüzlük halında			
<i>Azitromisin (Azithromycinum)</i>	1-ci gün: 0,5 q x 1 d/g daxilə, sonra 0,250 q x 1 d/g daxilə Və ya 0,5 q x 1 d/g daxilə	5 gün 3 gün	A
<i>Klaritromisin (Clarithromycinum)</i>	0,5 q x 2 d/g daxilə	10 gün	A
Ağız boşluğunda prosedurlar zamanı yoluxucu endokarditin antibakterial profilaktikası			
	<i>Prosedurdan 20-30 dəqiqə əvvəl</i>		
<i>Amoksisillin (Amoxicillinum)</i>	2 q daxilə	bir dəfəlik	A
<i>Ampisillin (Ampicillinum)</i>	2 q v/d və ya ə/d		A
<i>Sefazolin (Cefazolin)</i> və ya <i>Seftriakson (Ceftriaxone)</i>	1 q v/d və ya ə/d		A
Beta-laktam antibiotiklərinə qarşı dözümsüzlük (allergiya) olduqda			
<i>Azitromisin (Azithromycinum)</i> və ya <i>Klaritromisin (Clarithromycinum)</i>	500 mq daxilə	bir dəfəlik	A
Ürək çatışmazlığı simptomlarının müalicəsi (mitral çatışmazlıq B-D mərhələsi)			
Angiotensin çevirici ferment inhibitorları – İAÇF:			
<i>Kaptopril (Captopril)</i>	6,25 - 12,5 mq daxilə hər 8 saatda bir	Uzun müddət	A

Enalapril (Enalapril)	2,5 - 5 mq daxilə hər 12 saatda bir		
Lizinopril (Lisinopril)	5 mq - 10 mq gündə 1 dəfə daxilə		
Angiotensin reseptor antaqonistləri (ARA)			
Kandesartan (Candesartan)	4-12 mq/gün	Uzun müddət	A
Valsartan (Valsartan)	40-80 mq/gün		
Losartan (Losartan)	50-100 mq/gün		
β- Blokatorlar:			
Bisoprolol (Bisoprolol)	1,25 – 5 mq/gün	Uzun müddət	A
Atenolol (Atenolol)	25 – 50 mq/gün		
Karvedilol (Carvedilol)	6,25 – 50 mq/gün		
Metoprolol (Metoprolol)	50 – 100 mq/gün		
Aldosteron antaqonistləri:			
Spironolakton (Spironolactone)	50 - 100 mq/gün daxilə	Uzun müddət	B
Diuretiklər			
Furosemid (Furosemide)	20 – 40 mq daxilə	XÜÇ zamanı kompleks terapiya-nın tərkibində	B
İnotrop dəstək			
Digoksin (Digoxin)	0,125 – 0,25 mq/gün daxilə	Atrial fibrilyasiya- nın taxsistolik formasında	B
Antikoagulyant terapiya			
Heparin (Heparin)	0,5-1,0 mq/kq və ya 5000 vahid v/d gündə 1-2 dəfə	Göstərişlərə görə, APTT monitorinqinə əsasən	A

Əlavə d/v siyahısı: yox.

aPTT Aktivləşdirilmiş qismən tromboplastin vaxtı (Activated partial thromboplastin time – aPTT)

d/v dərman vasitəsi

XÜÇ Xronik ürək çatışmazlığı

v/d vena daxili

*SD – sübut dərəcəsi

V – vahid

ə/d – əzələ daxili; d/g – dəfə / gündə

Ədəbiyyat:

1. Стеноз митрального клапана. Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан) Available from: <https://ref.az/2J2EbC8>
2. Недостаточность митрального клапана, 2016. Available from: <https://ref.az/2KP9TzA>