

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	I Qan dövranı sisteminin xəstəlikləri
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Yusifova B.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
I73.0.	Reyno sindromu

Müalicə

Dərman müalicəsi:

- terapiyanın xarakteri və həcmi Reyno xəstəliyinin hücumlarının intensivliyindən və ağırlaşmalarından asılıdır;
 - ilkin SR zamanı dərman müalicəsi əsasən qışda göstərilir;
 - ikincili SR zamanı bütün xəstələrə uzunmüddətli dərman müalicəsini aparmaq lazımdır ;
- Birincili SR-də tez-tez və uzun müddətli vazospazm epizodları hallarında və ikincili SR olan xəstələrdə dərman müalicəsi lazımdır. Bu məqsədlə vazodilatatorlar və antiaqreqantlar istifadə olunur.

DV(beynəlxalq patentləşdiril məmiş adı)	Farmakoloji qruplar	Yeridilmə üsulu	Birdəfəli k doza	Tətbiq tezliyi	Müalicə müddəti
Kalsium kanalının antaqonisti:					
<i>Nifedipin</i> (Nifedipine)		Daxilə	30-60 mq;	gündə 2-4 dəfə;	uzun müddət
<i>Amlodipin</i> (Amlodipine)	Kalsium kanalının antaqonisti	Daxilə 2,5 mq, 5 mq, 10 mq;	2,5-20 mq	gündə 1 dəfə	uzun müddət
<i>Diltiazem</i>	Kalsium	Daxilə	gündə	Gündə 3-	uzun

(Diltiazem) hidrokslorid	kanalının antaqonisti	retard 90 mq, 180 mq	30-180 mq;	4 dəfə	müddət
Nikardipin (Nicardipine)	Kalsium kanalının antaqonisti	Daxilə 0,02 q (20 mq).	Gündə 20-60 mq	Gündə 1- 3 dəfə	uzun müddət
Prostaglandin analoqları:					
İloprost (Iloprost)	Təbii prostagland in E1-in sintetik analoqu	v/d, a/d infuziya üçün məhlul hazırlam aq üçün konsentr at	10-60 mq	gündə 1 dəfə	5-15 günlük kurslar
Alprostadi (Alprostadi)	Təbii prostagland in E1-in sintetik analoqu	v/d, a/d infuziya üçün məhlul hazırlam aq üçün liyofilizat 20 mkq; infuziya məhlulun un hazırlan ması üçün konsentr at 0,1 mq/0,2 ml	10-60 mq	gündə 1 dəfə	5-15 günlük kurslar
Fosfodiesteraz-5 ferment inhibitorları					
Sildenafil (Sildenafil)		Daxilə			
Vasodilatatorlar, angioprotektiv vasitələt					
Dipiridamol (Dipyridamole)		Daxilə	75-150 mq	gündə 3 dəfə	1-3 ay, kurslarla
Pentoksifilin (Pentoxifylline)		v/d, a/d, daxilə;	100-600 mq	gündə 1- 3 dəfə	v/d 5 gün, daxilə olaraq 1- 3 ay,

					kurslarla
--	--	--	--	--	-----------

Əlavə dərmanların siyahısı

DV(beynəlxalq patentləşdirməmiş adı)	Farmakoloji qruplar	Yeridilmə üsulu	Birdəfəlik doza	Tətbiq tezliyi	Müalicə müddəti
Angiotensin II reseptor blokatorları					
Losartan (Losartan)		daxilə	12,5-50 mq	Gündə 1-2 dəfə	uzun müddət
Qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanlar:					
Diklofenak (Diclofenac)		daxilə, ə/d	75-200 mq	Gündə 1-3 dəfə	kurslarla
Meloksikam (Meloxicam)		daxilə, ə/d	7,5-15 mq	Gündə 1-2 dəfə	kurslarla
Nimesulid (Nimesulide)		daxilə	100-200 mq	Gündə 1-2 dəfə	kurslarla
Lornoksikam (Lornoxicam)		daxilə, ə/d, v/d	Gündə 8-32 mq	Gündə 1-2 dəfə	kurslarla
Analgetiklər					
Tramadol (Tramadol)	Opioid narkotik analgetik	daxilə, ə/d, v/d		Gündə 1-2 dəfə	kurslarla

Ədəbiyyat

Синдром Рейно. Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан). Available from: <https://ref.az/38qGiYa>