

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>I - Qan dövranı sisteminin xəstəlikləri</b>
---------------------------------	--

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Abasova İ.</b>
---	-------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>I10-I15</b>	Qan təzyiqinin yüksək olması ilə səciyyələnən xəstəliklər
<b>I15</b>	İkincili hipertenziya
<b>I13</b>	Ürək və böyrəklərin zədələnməsi ilə üstünlük təşkil edən hipertenziv xəstəlik

## **Müalicə**

### **Uşaq və yeniyetmələrdə arterial hipertenziya**

#### *AMBULATOR MÜALİCƏ*

#### **Dərman müalicəsi:**

#### **Əsas dv siyahısı:**

Uşaq və yeniyetmələrdə arterial hipertenziyanın müalicəsində həm mono-, həm də kombine edilmiş terapiya istifadə olunur.

#### **Cədvəl 1.**

#### **AH dərəcəindən və formasından asılı olaraq uşaq və yeniyetmələrdə istifadə olunan antihipertenziv dərmanların siyahısı**

<b>Dv-nin BPA</b>	<b>Doza, tezliyi, müddəti və tətbiq üsulu, başlanğıc doza</b>	<b>Maksimal doza</b>	<b>SD</b>
<b>Diuretiklər</b>			
<b><i>Amilorid (AMILORIDE)</i></b>	Gündə 0,4-0,6 mq/kq	20 mq	A

	1 d/ g		
<b>Xlortalidon</b> ( <i>CHLORTHALIDONE</i> )	Gündə 0,3 mq/kq, 1 d/g	2mq/kq-dan 50 mq-dək	A
<b>Furosemid</b> ( <i>Furosemide</i> )	0,5-2,0 mq/kq 1 dozaya, 1-2 d/g	6 mq/kq	B
<b>Hidroxlortiazid</b> ( <i>Hydrochlorothiazide</i> )	Gündə 0,5-1 mq/kq, 1 d/g	3 mq/kq/sutkada	B
<b>Spirolakton</b> ( <i>Spirolactone</i> )	1 mq/kq	3,3 mq/kq/sutkada 100 mq-a qədər	B
<b>Eplerinon</b> ( <i>EPLERENONE</i> )	25 mq, gündə 1-2 dəfə	100 mq	A
<b>Hidroxlortiazid + triamteren</b> ( <i>Hydrochlorothiazide</i> ) ( <i>TRIAMTERENE</i> )	1-2 mq/kq, 2 d/g	3-4 mq/kq 300 mq-a qədər	A
<b>Beta blokatorlar</b>			
<b>Atenolol</b> ( <i>Atenolol</i> )	Gündə 0,5-1 mq/kq, 1- 2 d/g	2 mq/kq-dan 100 mq-a qədər	A
<b>Metoprolol tartrat</b> ( <i>Metoprolol Tartrate</i> )	Gündə 0,5-1,0 mq/kq, 1-2 d/g	2 mq/kq	A
<b>Propranolol</b> ( <i>PROPRANOLOL</i> )	Gündə 1 mq/kq, 2-3 d/g	4 mq/kq-dan 640 mq-dək	A
<b>Kalsium kanallarının blokatorları</b>			
<b>Amlodipin</b> ( <i>Amlodipine</i> )	0,06-0,3 mq/kq, 1 d/g	5-10 mq	A
<b>Nifedipin</b> ( <i>Nifedipine</i> )	0,25-0,5 mq/gün, 1-2 d/g	3 mq/kq/gün	A
<b>AÇFİ</b>			
<b>Kaptopril</b> ( <i>Captopril</i> )	0,3-0,5 mq/kq/gün, 2-3 d/g	6 mq/kq	B
<b>Enalapril</b> ( <i>Enalapril</i> )	0,08-0,6 mq/kq, 2 d/g		B
<b>Fozinopril</b> ( <i>Fosinopril</i> )	0,1 – 0,6 mq/kq, 1 d/g	40 mq	B
<b>Lizinopril</b> ( <i>Lisinopril</i> )	0,08-0,6 mq/kq, 1 d/g	0,6 mq/kq 40 mq-dək	B
<b>Ramipril</b> ( <i>Ramipril</i> )	1,5-6 mq		B
<b>Angiotenzin reseptor blokatorları</b>			
<b>Kandesartan</b> ( <i>Candesartan</i> )	0,16-0,5 mq/kq, 1 d/g		B
<b>İrbesartan</b> ( <i>Irbesartan</i> )	75-100 mq, 1 d/g	300 mq	B
<b>Losartan</b> ( <i>Losartan</i> )	0,7 mq/kq 50 mq-a qədər, 1-2 d/g	1,4 mq/kq 100 mq-a qədər	B
<b>Valsartan</b> ( <i>Valsartan</i> )	0,4 mq/kq	40-80 mq 1d/g	B

AH arterial hipertenziya  
AÇFİ angiotenzin çevirici ferment inhibitorları  
BPA Beynəlxalq patentlənməmiş adı  
Dv dərman vasitəsi  
d/g dəfə gündə  
SD sübutların dərəcəsi

## **ƏDƏBİYYAT:**

Артериальная гипертензия у детей и подростков. Республиканский центр развития здравоохранения. Клинические протоколы МЗ РК - 2017 (Казахстан). Available from: <https://ref.az/jSt9vU>