

| | |
|---------------------------------|---|
| Xəstəlik sinifi (XBT-10) | J-Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri |
|---------------------------------|---|

| | |
|---|--------------------|
| İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM) | Camalova Ü. |
|---|--------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| XBT-10 rubrikası | Xəstəliklər |
| J20.0 | <i>Mycorplasma pneumoniae</i> tərəfindən törədilən kəskin bronxit |

Müalicə

Dərman müalicəsi:

Yalnız selikli qişalara təsir edən və ağır olmayan gedişatda:

Ampisillin 200-400 mq/kq/gün (*uşaqlar üçün*), 6 q/gün (*böyükələr üçün*), parenteral olaraq daxil edilir;

Amoksisillin 80-90 mq/kq/gün, daxilə qəbul etmək;

Effektiv olmadıqda, bakteriya tərəfindən istehsal olunan beta-laktamazlara davamlı

Amoksisillin-klavulanat

və ya

Sefalosporinlərdən istifadə etmək mümkündür.

Əgər penisillinə qarşı allergiyavarsa:

Makrolidlər (klaritromisin, azitromisin), xloramfenikol, ftorxinollar və biseptol tövsiyə olunur.

Klinik olaraq şübhəli və ya ağır Hib ştammi üçün:

1. Antibiotiklərin parenteral təyin olunması;
2. Müxtəlif qrupların iki antibiotikinə birləşməsi. Məsələn, ***sefalosporinlər + xloramfenikol***.

Müalicə kursu 10-14 gün təşkil edir.

Ədəbiyyat

Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] (J20.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-haemophilus-influenzae-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0-j20-1/4248>