

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>J-Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri</b>
---------------------------------	---

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Camalova Ü.</b>
---	--------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>J42</b>	<b>Dəqiqləşdirilməmiş xroniki bronxit</b> <i>Daxil edilib:</i> Xroniki: • ƏGO bronxit • traxeit • traxeobronxit <i>Çıxarılıb:</i> xroniki: • astmatik bronxit (J44.–) • bronxit: • sadə və selikli-irinli (J41.–) • tənəffüs yollarının obstruksiyası ilə müşayiət olunan (J44.–) • emfizematoz bronxit (J44.–) • ƏGO obstruktiv ağciyər xəstəli
<b>J41.0</b>	<b>Sadə xroniki bronxit</b>
<b>J41.1</b>	<b>Selikli-irinli xroniki bronxit</b>
<b>J41.8</b>	<b>Qarışıq, sadə və selikli-irinli xroniki bronxit</b>

## **Müalicə**

### **Dərman müalicəsi:**

**Ambroksol** (ambroxol) həb 30,0 mq, gündə 3 dəfə, 7-10 gün;

*1 yaşa qədər uşaqlar* - şərbət 15 mq/5 ml, gündə 3 dəfə.

*Antibiotik terapiyası yalnız uzunmüddətli qızdırma və sətəlcəmin digər əlamətləri olduqda təyin edilir:*

**Amoksisillin** (amoxicillin) 15 mq/kq, gündə 3 dəfə, 5 gün

və ya qorunan penisilinlər (**amoksisillin + klavulan** turşusu 20-40 mq/kq, gündə 3 dəfə) .

*Hərərətin aradan qaldırılması* - 38,5-dən yuxarı (**parasetamol** - gündə 4 dəfə 10-15 mq/kq);

**Salbutamol** (salbutamol) ilə müalicə yalnız 1 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün dozalarda istifadə olunur: *inhalyasiya* 0,2-0,3 mq/kq/gün və ya 1-2 doza, gündə 2-4 dəfə, həmçinin kapsullarda 2,0 mq, 1 kapsula, gündə 3 dəfə.

## Ədəbiyyat

Обструктивный бронхит у детей

Версия: Архив - Клинические протоколы МЗ РК - 2007 (Приказ №764)

<https://diseases.medelement.com/disease/12666>

Острый и хронический бронхит

Версия: Клинические протоколы 2006-2019 (Беларусь)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82-%D0%BA%D0%BF-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-2012/16281>