

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>J-Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri</b>
---------------------------------	---

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Camalova Ü.</b>
---	--------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>J00</b>	<b>Kəskin nazofaringit (zökəm)</b>
<b>J02.8</b>	<b>Digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən kəskin faringit</b>
<b>J02.9</b>	<b>Dəqiqləşdirilməmiş kəskin faringit</b>
<b>J03.8</b>	<b>Digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən kəskin tonzillit</b>
<b>J03.9</b>	<b>Dəqiqləşdirilməmiş kəskin tonzillit</b>
<b>J04</b>	<b>Kəskin laringit və traxeit</b>
<b>J04.0</b>	<b>Kəskin laringit</b>
<b>J04.1</b>	<b>Kəskin traxeit</b>
<b>J04.2</b>	<b>Kəskin laringotraxeit</b>
<b>J06</b>	<b>Yuxarı tənəffüs yollarının çox saylı və dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı kəskin infeksiyaları</b>
<b>J06.0</b>	<b>Kəskin laringofaringit</b>
<b>J06.8</b>	<b>Yuxarı tənəffüs yollarının çox lokalizasiyalı digər kəskin infeksiyaları</b>
<b>J09-J18</b>	<b>Qrip və pnevmoniya</b>

### **Müalicə**

**Əsas dərman müalicəsi:**

Xəstəliyin başlanğıcından sonra ilk 36-48 saat ərzində **Oseltamivir** (virus əleyhinə) 75 mq, 2 dəfə, 5 gün (yalnız hamilə qadınlar üçün).

**Əlavə dərmanların siyahısı:**

**Parasetamol** (paracetamolum) 500 mq, daxilə, gündə 2,0 q-dan çox olmamalıdır.

**Ədəbiyyat**

Грипп и ОРВИ

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2019 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/16085>