

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	J-Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri
---------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Camalova Ü.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
J01	Kəskin sinusit
J01.0	Kəskin yuxarı çənə sinusiti
J01.8	Digər kəskin sinusit

Müalicə

Dərman müalicəsi :

2 yaşa qədər uşaqlarda ağırlaşmamış kəskin bakterial sinusit, xəstəliyin yüngül və orta dərəcədə olanlar üçün:

Amoksisillin (amoxicillin) gündə 45 mq/kq, 2 dəfə və ya gündə 90 mq/kq, 2 dəfə.

Xəstənin antibiotiklərə qarşı allergiyası varsa, sefalosporinlər təyin oluna bilər:

Sefdinir (cefdinir) 14 mq/kq/gün, 1-2 dəfəyə;

Sefuroksim (ceuroxime) 30 mq/kq/gün, 2 dəfəyə;

Sefaklor (cefaklor)

və ya

Sefpodoksım (cefpodoxime) 10 mq/kq/gün.

Ciddi allergik reaksiyalar zamanı:

Klaritromisinin (clarithromycin) 15 mq/kq/gün, 2 dəfəyə

və ya

Azitromisin (azithromycin) ilk gün 10 mq/kq/gün, sonra 5 mq/kq/gün 4 gün.

Alternativ variant - penisilinə davamlı St. Pnevmoniya :

Klindamisin (clindamycin) 30-40 mq/kq/gün 3 dəfəyə.

Müsbət dinamika yoxdursa və xəstənin vəziyyəti yaxşılaşmırsa, müalicəyə:

Amoksisillin/klavulon turşusu yüksək dozalarda gündə 80-90 mq/kq amoksisillin və 6,4 mq/kq/gün klavulon 2 dəfəyə başlamaq lazımdır.

Alternativ terapiya

Sefdinir, sefuroksim, sefpodoksimin təyin olunması. Əgər xəstədə qusma varsa seftriaksonun birdəfəlik dozaları (50 mq/kq/gün) venadaxili və ya əzələdaxili. 24 saat sonra xəstənin klinik vəziyyəti yaxşılaşdıqda dərmanın qəbulunu daxilə davam etmək.

Ədəbiyyat

Синусит у детей

Версия: Архив - Клинические протоколы МЗ РК - 2007 (Приказ №764)

<https://diseases.medelement.com/disease/12716>