

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	J-Tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri
---------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Camalova Ü.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
J84.1	Fibroz olduğu göstərməklə digər interstisial ağciyər xəstəlikləri Diffuz ağciyər fibrozu Fibrozlaşan alveolit (kriptogen) Hammen-Riç sindromu İdiopatik ağciyər fibrozu Sadə interstisial pnevmoniya Çıxarılıb: nəfəsalma zamanı ağciyərlərə daxil olan kimyəvi maddələr, qazlar, tüstülər və buxarların təsirindən yaranan ağciyər fibrozu (xroniki) (J68.4) şüalanma nəticəsində yaranan ağciyər fibrozu (xroniki) (J70.1)

Müalicə

Hüceyrədaxili tirozin kinaza inhibitoru

Nintedanib (nintedanib) 150 mq (1 kapsul), gündə 2 dəfə, davamlı olaraq hər 12 saatdan bir.

İltihab əleyhinə və antifibrotik təsir göstərən immunosupressant

Pirfenidon (pirfenidone) 801 mq (3 kapsul 267 mq), gündə 3 dəfə yemək zamanı (2403 mq/gün). Doza tədricən 14 gün ərzində gündə 9 kapsulun tövsiyə olunan səviyyəsinə qədər artırılmalıdır:

- 1-7 gün: 1 kapsul (267 mq), gündə 3 dəfə (801 mq/gün)
- 8-14-cü gün: 2 kapsul, gündə 3 dəfə (1602 mq/gün)

- 15-ci gündən başlayaraq: 3 kapsul, gündə 3 dəfə (2403 mq/gün)

Ədəbiyyat

Идиопатический легочный фиброз

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2017 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7/15419>