

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>K - Həzm sisteminin xəstəlikləri</b>
-------------------------------------	-----------------------------------------

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)</b>	<b>Məmmədova L.</b>
--------------------------------------------------	---------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>K83.4</b>	Oddi sfinkterinin spazmı

## **Müalicə**

OS disfunksiyasının müalicəsinə aşağıdakılar daxildir:

Yağlı yeməkləri məhdudlaşdırılması ilə fraksiyalı qidalanma;

Ağrı tutmalarının aradan qaldırılması:

**Nifedipin (Nifedipine)** dil altına (10-20 mq) və ya

**Nitrogliserin (Nitroglycerin)** dil altına 1 tablet;

miotrop spazmolitiklər:

**Drotaverin (Drotaverine)** 80 mq gündə 3 dəfə,

**Butilskopolamin (Butylscopolamine)** 10 mq gündə 3 dəfə oral və ya rektal şam,

**Himekromona (Hymecromone)** 200 mq gündə 3 dəfə oral,

**Mebeverin hidroxlorid (Mebeverine hydrochloride)** 200 mq gündə 2 dəfə oral 4 həftə;

I tip OS disfunksiyası (spesifik pozğunluq) zamanı papillosfinkterotomiya aparılması tövsiyə olunur.

Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями органов пищеварения» (утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2017 № 54)

<https://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/CProtokol/%D0%9A%D0%9F%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2001.06.2017%20%E2%84%96%2054.pdf>