

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>M - Sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri</b>
-------------------------------------	---

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)</b>	<b>Süleymanov Vaqif</b>
--	-------------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
M 02	Reaktiv artropatiyalar
M 66.2	Açıq vətərlərin spontan qırılması
M 66.3	Bükücü vətərlərin spontan qırılması
M 66.4	Digər tendonların spontan qırılması
M 70.4	Prepatelyar bursit
M 70.5	Diz oynağının digər bursitləri
M 70.6	Böyük burmanın (bud sümüyünün) bursiti
M 70.7	Budun digər bursitləri
M 76.4	Qamış kollateral (Pelleqrini-Ştidi) bursiti
M 77.0	Medial epikondilit
M 77.1	Lateral epikondilit

## **Müalicə**

### **Ambulator şəraitdə istifadə olunan dərmanlar**

Reaktiv artropatiyalar iltihab ələhinə qeyristeroid dərmanlar :

- **diklofenak (diclofenac)** 0,05 q daxilə, gündə 3 dəfə 10-14 gün ərzində
- **meloksikam (meloxicam)** 7,5-15 mq daxilə 10-14 gün
- **parasetamol (paracetamoli)** daxilə 350 mq daxilə gündə 2-4 dəfə.

Açıq vətərlərin spontan qırılması, digər tendonların spontan qırılması:

- **diklofenak (diclofenac)** 0,05 q daxilə, gündə 3 dəfə 10-14 gün ərzində
- **meloksikam (meloxicam)** 7,5-15 mq daxilə 10-14 gün
- **parasetamol (paracetamoli)** daxilə 350 mq daxilə gündə 2-4 dəfə.

Fizioterapevtik müalicə: 0,5% prokain (prokaini) məhlulunun elektroforezi zədələnmə sahəsi üçün 10 gün; fonoforez 1% hidrokortizon zədələnmə

sahəsi üçün 10 prosedur; ozokerit tətbiqləri. Zərər dəymiş sahə üçün 10 prosedur

Prepatelyar bursit, diz oynağının digər bursitləri:

- **diklofenak (diclofenac)** 0,05 q gündə 3 dəfə 7 gün ərzində daxilə
- **meloksikam (meloxicam)** daxilə 7,5-15 mq 10-14 gün
- **lornoksikam (lornoxicam)** daxilə sutkada 8-32 mq 1-2 dəfə
- **parasetamol (paracetamoli)** daxilə 350 mq sutkada 2-4 dəfə

Böyük burmanın (bud sümüyünün) bursiti, budun digər bursitləri, qamış kollateral (Pelleqrini-Ştidi) bursiti -

- **diklofenak (diclofenac)** 0,05 q daxilə gündə 3 dəfə 7-10 gün ərzində
- **meloksikam (meloxicam)** daxilə 7,5-15 mq 10-14 gün,
- **parasetamol (paracetamoli)** daxilə 350 mq sutkada 2-4 dəfə
- fizioterapevtik müalicə: ozokerit tətbiqləri; elektrik stimullaşdırılmaı 10 gün; radon hamamları 10 gün; elektroforez 1% kalium yodid məhlulu 10 gün

## Ədəbiyyat

Ревматические заболевания у взрослых Версия: Клинические протоколы 2006-2019 (Беларусь)

<https://diseases.medelement.com/disease/ортопедо-травматологические-больные-кп-беларусь-2006/16359>