

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>M - Sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri</b>
-------------------------------------	---

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)</b>	<b>Süleymanov Vaqif</b>
--	-------------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
-----------------------------	--------------------

M 08.0	Gənclik revmatoid artriti
M 08.3	Gənclik poliartriti (seroneqativ)
M 08.4	Pausiartikulyar gənclik artriti

Gənclik (yuvənıl) artriti , digər oynaq patologiyaları istisna olunmaqla 16 yaşa qədər uşaqlarda inkişaf edən, 6 həftədən çox davam edən, səbəbi bilinməyən artritdir.

## **Müalicə**

Konservativ müalicə

### Gənclik poliartriti M08.3

Müayinə mərhələsində bütün xəstələrə ağrının olması halında qeyristerodli iltihabəlehinə preparatların (QSİƏP) təyin edilməsi tövsiyə olunur

*İstifadə etmək tövsiyə olunur:*

- diklofenak (diclofenac) v/d (6 yaşdan sonra) 2-3 mq/kq/sut və ya
- nimesulid (nimesulid) 12 yaşdan sonra) 3-5 mq/kq/sut və ya
- meloksikam (meloxikan) 15 yaşdan sonra) 7,5-15 mq/sut
- 2 aydan çox QSİƏP ilə monoterapiya tövsiyə edilmir. bütün xəstələrdə.
- QS-nin intraartikulyar yeridilməsi xəstəliyin istənilən mərhələsində (göstəriş olarsa) yanaşı terapiya kimi tövsiyə olunur

### Gənclik revmatoid artriti seropozitiv M08.0

Müayinə mərhələsində bütün xəstələrə ağrının olması halında QSİƏP-lərin təyin edilməsi tövsiyə olunur

*İstifadə etmək tövsiyə olunur:*

- diklofenak ə/d (6 yaşdan) 2-3 mq/kq/sut və ya
- nimesulid (12 yaşdan) 3-5 mq/kq/sut və ya
- meloksikam (15 yaşdan) 7,5-15 mq/sut
- 2 aydan çox QSİƏP ilə monoterapiya tövsiyə edilmir. bütün xəstələrdə.
- QS-nin intraartikulyar yeridilməsi xəstəliyin istənilən mərhələsində (göstəriş olarsa) yanaşı terapiya kimi tövsiyə olunur .

#### Pausiarticular gənclik artriti M08.4

Müayinə mərhələsində bütün xəstələrə ağrının olması halında QSİƏP-lərin təyin edilməsi tövsiyə olunur ]

*İstifadə etmək tövsiyə olunur:*

- diklofenak v/d (6 yaşdan) 2-3 mq/kq/sut və ya
- nimesulid (12 yaşdan) 3-5 mq/kq/sut və ya
- meloksikam (15 yaşdan) 7,5-15 mq/sut
- QSİƏP monoterapiyası 2 aydan çox tövsiyə edilmir. əlverişsiz proqnoz amillərindən asılı olmayaraq bütün xəstələrdə.
- QS-nin intraartikulyar yeridilməsi xəstəliyin istənilən mərhələsində (göstəriş olarsa) yanaşı terapiya kimi tövsiyə olunur .

### Ədəbiyyat

Юношеский артрит также: ювенильный артрит, ювенильный идиопатический артрит Версия: Клинические рекомендации РФ 2013-2017 (Россия)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%84/15986>

