

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	M - Sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri
-------------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)	Süleymanov Vaqif
--	-------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
M60.0.	İnfeksiyon miozit

Müalicə

"Miyozit" termini - zolaqlı skelet əzələsindəki hər hansı bir iltihab prosesinə aiddir. Terapiyanın əsasını analgetik və iltihabəleyhinə dərmanlar, ilk növbədə qeyristeroidlər təşkil edir. Onlar yerli olaraq (kremlər, məlhəmlər, gəllər) və ya sistemli şəkildə tətbiq olunur (əsasən parenteral)

Ambulator şəraitdə istifadə olunan dərmanlar

Adı	Buraxılış forması	Təvsiyə olunan dozalar
Fenilbutazon (phenylbutazone) məlhəmi	Xarici istifadə üçün məlhəm	İltihab ocağının üstündən sürütməklə gündə 2-3 dəfə tətbiq olunur. Müalicə kursu 7-10 gün
Meloksikam (meloxicam) kremi	Xarici istifadə üçün krem	Gündə 1-3 dəfə xarici istifadə üçün az miqdarda gel (3-5 sm) bədən iltihablı və ya ağrılı hissəsinin dərisinə nazik təbəqə tətbiq olunur

Ketoprofen (ketoprofen) gel	Xarici istifadə üçün gel	Gündə 1-3 dəfə xarici istifadə üçün az miqdarda gel (3-5 sm) bədən iltihablı və ya ağrılı hissəsinin dərisinə nazik təbəqə tətbiq olunur
Tenoksikam (tenoxicam)	20 mq-lıq həblər	Daxilə 20 mq (1 həb) gündə 1 dəfə yeməkdən sonra, uzun müddət istifadəsi zamanı - gündə 10 mq
Nimesulid (nimesulide)	Həblər, süspensiya hazırlamaq üçün qranullar	Böyüklər üçün birdəfəlik doza 50-200 mq (orta hesabla 100 mq, maksimal doza gündə 400 mq) təşkil edir. Gündə 2 dəfə daxilə qəbul edilir.
Diklofenak (diclofenac)	Həblər	Tövsiyə olunan başlanğıc doza - gündə 100 mq təşkil edir.
İbuprofen (ibuprofen)	Kapsullar, həblər	Böyüklər və 12 yaşdan yuxarı uşaqlar: daxilə 1 kapsula (200 mq), çeynəmədən, gündə 3-4 dəfəyə qədər.
Meloksikam (meloxicam)	Rektal şamlar	Rektal şamların gündə bir dəfə 7,5 mq dozada istifadəsi tövsiyə

		olunur. Daha ağır hallarda, 15 mq dozada şamlardan istifadə etməkmümkündür. Maksimal gündəlik doza 15 mq-dan çox olmamalı.
Diklofenak (diclofenac)	Əzələdaxili inyeksiya üçün 75 mq məhlul	Sutkalıq doza 1 ampula (75 mq) gündə 1 dəfə. Ağır hallarda, bir neçə saatdan sonra 75 mq-lıq 2 ampula inyeksiya edilə bilər (ikinci inyeksiya kontralateral çanaq nahiyəsində aparılmalıdır.
Tenoksikam (tenoxicam)	Vena və əzələdaxili inyeksiya üçün məhlul hazırlamaq üçün liyofilizat	Qısa müddətli (1-2 gün) müalicə üçün gündə bir dəfə 20 mq dozada v/d və ə/d istifadə olunur. Terapiyanın uzadılmasına ehtiyac olduqda tenoksikamın müafiq dozada daxili dərman formalarına keçmək olar.
Meloksikam (meloxicam)	7,5 mq əzələdaxili inyeksiya üçün məhlul.	Gündə 7,5 mq ə/d inyeksiya üçün məhlul. Lazım gələrsə, bu doza gündə 15 mq qədər artırıla bilər

Ədəbiyyat

<https://www.provrach.ru/article/15064-taktika-lecheniya-miozita-21-m01-19>