

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	M - Sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri
-------------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)	Süleymanov Vaqif
--	-------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
M 36.8	Obliterasiya edən trombangiit (Vinivarter-Bürger xəstəliyi)

Müalicə

Stasionar mərhələdə terapiyanın davam etdirilməsi:

1. Sistemli istifadə üçün qlükokortikoidlər:
 - **prednizolon (prednisoloni)** 0,5-1 mq/kq/sut (60 mq/sut çox olmayan) və ya **metilprednizolon (methylprednisoloni)** 0,4-0,8 mq/kq/sut (48 mq/sut çox olmayan) xəstəxanadan çıxdıqdan sonra 2-4 həftə daxilə olaraq, ardınca 2 həftə ərzində 5 mq/sut (4 mq/sut) və tədricən dəstəkləyici dozaya qədər azaldılır: prednizolon 5-15 mq/sut (metilprednizolon 4-12 mq/sut).
2. Antiaqreqantlar:
 - **asetilsalisil turşusu (acidum acetylsalicylicum)** 75 mq/sut daxilə;
 - **pentoksifillin (pentoxifylline)** 600-800 mq/sut daxilə
3. Statinlər: **atorvastatin (atorvastatin)** 10-20 mq/sut daxilə və s.
4. Osteoporozun müalicəsi və qarşısının alınması üçün dərmanlar

Ədəbiyyat

Ревматические заболевания у взрослых Версия: Клинические протоколы 2006-2019 (Беларусь)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BF-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-2012/16302>