

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	M - Sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri
-------------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)	Süleymanov Vaqif
--	-------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
M 35.3	Revmatik polimialgiya

Müalicə

Revmatik polimialgiya - boyun, çiyin və omba əzələ qruplarında ağrı və sərtliyə səbəb olan iltihablı bir xəstəlikdir.

Ambulator müalicə taktikası:

- Kliniki və laboratoriya remissiyasına nail olmaq;
- Kəskinləşmə riskinin azaldılması;
- Həyati orqanların geri dönməz zədələnməsinin qarşısının alınması;
- Dərman müalicəsinin yan təsirləri riskinin azaldılması;
- Ömür uzunluğunun artması.

Ambulator şəraitdə istifadə olunan dərmanlar

Qlükokortikosteroidlər:

1. **Metiprednizolon (methylprednisolone)** - 4 mg sutkada 2 dəfə uzun müddət

2. **Prednizolon (prednisolone)**- 5 mq sutkada 2 dəfə uzun müddət

3. **Triamsinolon (triamcinolone)** - 0.004-0.008 mq daxilə, sutkada 3-4 dəfə, kurs ilə

4. **Betametazon (betamethasone)** - yerli krem 1-2 q sutkada 1-2 dəfə, kurs ilə

5. **Deksametazon (dexamethasone)** - 0,5-1,5 mq/sut ərzində sutkada 1 dəfə, kurs ilə

İmmunosupressiv dərmanlar:

6. **Siklosporin (cyclosporine)** daxilə 50-100 mq, sutkada 1-2 dəfə, uzun müddət

7. **Azatioprin (azathioprine)** daxilə 50-100mg, sutkada 1-2 dəfə, uzun müddət

8. **Mofetilamikofenolat (mycophenolate mofetil)**, daxilə 250-2000 g sutkada 2 dəfə, uzun müddət

9. **Siklofosamid (cyclophosphamide)** 200 mq, məhlul hazırlamaq üçün toz 200-600 q, sxema üzrə, kurs ilə

10. **Siklofosamid (cyclophosphamide)** draje 50 mq, daxilə 50-100 mq, sutkada 1-2 dəfə, kurs ilə

11. **Leflunomid (leflunomide)** həblər 20 mq, daxilə, 20-40 mq sutkada 1 dəfə, kurs ilə.

12. **Metotreksat (methotrexate)** həbləri 2,5 mq, 5 mq 2,5-17,5 mq/həftə həftədə 1 dəfə, uzun müddət

13. **Kolxisin (colchicine)** həbləri 1,5 mq, sutkada 1 dəfə, uzun müddət

14. **Sulfemetoksazol (sulphamethoxazole)+trimetoprim ko-trimoksazol** daxilə, 120 mq-lıq həblər 160-800 mq, sutkada 1 dəfə

Genetik mühəndis-bioloji terapiya:,

15. **Rituximab (rituximab)** - infuziya üçün məhlul hazırlamaq üçün konsentrat 500-1000 mg, sxema üzrə, uzun müddət

Ədəbiyyat

Системные васкулиты Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/системные-васкулиты-2016/14951>