

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	M - Sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri
-------------------------------------	---

İlkin versiyanın tərtibatçı(İSİM)	Süleymanov Vaqif
--	-------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
-----------------------------	--------------------

M 35.6	Veber-Krisçenin residivləşən pannikuliti
--------	--

Müalicə

1. Sistemli istifadə üçün qlükokortikoidlər:
ambulator mərhələdə davam etdirildikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilmə dövründə daxilə olaraq prednizolon (prednisolone) 0,25-0,5 mq/kq/gün (methylprednisolone 0,2-0,4 mq/kq/gün)
2. Qeyristeroidli iltihabəlehinə preparatlar: aseklafenak (aceclofenac) 200 mq/sut daxilə ; şiddətli ağrılarda diklofenak (diclofenac) 100-150 mq/gün daxilə və ya əzələdaxili və ya nimesulid (nimesulide) 200-400 mq/sut daxilə qəbul edilir.
3. Mədə-bağırsaq traktının ağırlaşmaları üçün risk faktorları olduqda:
 - 3.1. Proton pompası inhibitorları: omeprazol (omeprazole) 20-40 mq/sut və ya rabeprazol(rabeprazole) 20-40 mq/sut , yaxud lansoprazol (lansoprazole) 30-60 mq/sut və ya pantoprazol(pantoprazole) 20-40 mq/sut və ya esomeprazol(esomeprazole) 20-40 mq/sut daxilə və s.və ya
 - 3.2. H2 histamin reseptor blokatorları: ranitidine(ranitidine) 0,15-0,3/gün daxilə və ya 0,05-0,1 q hər 6-8 saatdan bir v/d və ya ə/d; famotidin (famotidine) 0,02-0,04 mq/sut daxilə və s.

Ревматические заболевания у взрослых Версия: Клинические протоколы 2006-2019 (Беларусь)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BF-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-2012/16302>
<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BF-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-2012/16302>