

| | |
|---------------------------------|---|
| Xəstəlik sinifi (XBT-10) | N -Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri |
| Xəstəlik | |

| | |
|---|------------------------|
| İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM) | Pirverdiyeva A. |
|---|------------------------|

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| XBT-10 rubrikası | Xəstəliklər |
| N26 | Büzüşmüş böyrək,dəqiqləşdirilməmiş |
| N27 | Naməlum səbəbdən kiçik böyrək |

Müalicə

İzolyasiya olunmuş sidik sindromu:

antiaqreqantlar ən azı 1 ay ərzində daxilə: **dipiridamol (dipyridamole)** gündə 75-200 mq və ya **pentoksifilin (pentoxifylline)** gündə 300-600 mq

Simptomatik arterial hipertenziya:

ACE inhibitorları daxilə: **enalapril** 5-20 mq/gün və ya **fosinopril** 5-20 mq/gün və ya **lisinopril** 5-20 mq/gün və ya **ramipril** 1,25-10 mq/gün və ya **perindopril** 2-8 mq/gün və/və ya

angiotensin 2 reseptor antaqonistləri daxilə: **eprosartan (eprosartanum)** 600 mq/gün və ya **losartan** 50-100 mq/gün və ya **valsartan (valsartanum)** 80-160 mq/gün və ya **irbesartan** 150-300 mq/gün və ya **telmisartan** 40-160 mq/gün və/və ya

kalsium kanal antaqonistləri daxilə: **nifedipin (nifedipine)** gündə 5-40 mq və ya **amlodipin (amlodipine)** gündə 2,5-40 mq və ya **verapamil** gündə 120-480 mq və ya **diltiazem** gündə 180-480 mq və/və ya

β -blokatorlar daxilə: **bisoprolol** gündə 5-20 mq və ya **karvedilol** (**carvedilol**) gündə 6,25-100 mq və ya **metoprolol** gündə 50-100 mq və/və ya

a-blokatorlar: **doksazosin** (**doxazosin**) gündə 1-16 mq və ya **prazosin** gündə 0,5-20 mq və/və ya

imidosalin reseptlərinin selektiv agonistləri: **moksonidin** (**moxonidine**) 0,2 – 0,6 mq/gün.

Ödem sindromu:

diuretiklər daxilə: **furosemid** (**furosemide**) gündə 40-400 mq və/və ya **hipotiazid** (**hyothiazid**) gündə 25-200 mq və/və ya **spironolakton** (**spironolactone**) gündə 50-200 mq və/və ya gündə 2,5-5 mq **indapamid** (**indapamide**).

Lipid mübadiləsinin pozulması: lipidləri azaldan dərmanlar - statinlər: **simvastatin** (**simvastatinum**) 5 - 40 mq gündə və ya **pravastatin** 10 - 40 mq gündə və ya **lovastatin** (**lovastatinum**) gündə 10 -80 mq və ya **atorvastatin** gündə 10 - 80 mq

Hipertrigliceridemiya - fibratlar - gündə 145 mq, **fenofibrat** (**fenofibrate**).

Ədəbiyyat

Диагностика и лечение пациентов с нефрологическими заболеваниями (взрослое население)

Версия: Клинические протоколы 2006-2019 (Беларусь)

<https://shorturl.at/stxAH>