

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>N - Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri</b>
<b>Xəstəlik</b>	

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Pirverdiyeva A.</b>
---	------------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
N80.0.	Uşaqlığın endometriozu
N80.1.	Yumurtalıqların endometriozu
N80.2.	Uşaqlıq borusunun endometriozu
N80.3.	Canaq peritonunun endometriozu
N80.4.	Rektovaginal arakəsmənin və uşaqlıq yolunun endometriozu
N80.5.	Bağırsağın endometriozu
N80.6.	Dəri çapığının endometriozu

## **Müalicə**

Endometriozun dərman müalicəsinə daxildir:  
 spesifik terapiya - gonadoliberin agonistləri (GnRH), progestogenlər;  
 qeyri-spesifik terapiya - kombinə edilmiş oral kontraseptivlər, QSİP lar.

Şübhəli endometrioz, təsdiqlənmiş endometrioz və təkrarlanan endometrioz üçün xüsusi terapiya tövsiyə olunur .

Qeyri-spesifik terapiya - endometriozun dərman və ya cərrahi müalicəsinin təsirini gözləyərkən dismenoreya səbəbinin araşdırılması zamanı tövsiyə olunur.

Əsas dərmanların siyahısı - xüsusi terapiya:

Dərman qrupu/dərman	İstifadə qaydası	Göstərişlər	Sübut səviyyəsi A
<b><i>Triptorelin</i></b>	3.75 mq, 11.25 mq ə/d	Genital və ekstragenital endometrioz (mərhlə 1-4)	GnRH agonistlərini əlavə terapiya ilə birlikdə təyin edərkən, 6 ay və ya daha uzun kurs tövsiyə olunur. Təsdiqlənmiş endometriozlu xəstələri IVF üçün yönləndirərkən, IVF-dən 3-6 ay əvvəl əlavə terapiya ilə GnRH agonistlərinin tətbiqi IVF nəticələrini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.
<b><i>Dienogest</i></b>	2 mq, daxilə	Endometriozun müalicəsi	<b><i>Dienogest</i></b> 2 mq ən azı 6 ay istifadə olunur.

Əlavə dərmanların siyahısı - qeyri-spesifik terapiya:

Dərman qrupu/dərman	İstifadə qaydası	Göstərişlər	Sübut səviyyəsi
<b>Levonorgestrel UDK</b>	20 mq / 24 saat Uterus boşluğuna yerləşdirilmişdir	Dismenoreya, menorragiya, hipermenoreya, kontrasepsiya müalicəsi	UD B Qadınlarda endometrioz/ adenomiozun müalicəsi yoxdur.
QSIƏPlar	Rektal süpozituarlar, həblər: <b>Indometasin (indometacin)</b> 25 mq, həblər <b>Diklofenak (diclofenac)</b> 75 mq həblər, <b>Diklofenak (diclofenac)</b> 50 mq rektal sup. <b>Ketoprofen</b> 100 mq	Kəskin ağrı	Endometriozla əlaqəli ağrı
KOK monofazik, aşağı dozada, aydın antiproliferativ təsir göstərir	Həblər: <b>Etinil estradiol (ethinylestradiol)</b> 20 mq / <b>levonorgestrel / desogestrel / dienogest / gestoden (gestodene).</b> <b>Estradiol valerat</b> 1-2-3 mq/ <b>dienogest</b> 2 mq	Dismenoreya, kontrasepsiya	Tarixi dəyişmiş reproduktiv planlar

## Әдәбиyyат

Генитальный эндометриоз

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2018 (Казахстан)

<https://u.to/0EMEIA>