

| | |
|---------------------------------|---|
| Xəstəlik sinifi (XBT-10) | N -Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri |
|---------------------------------|---|

| | |
|---|------------------------|
| İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM) | Pirverdiyeva A. |
|---|------------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| XBT-10 rubrikası | Xəstəliklər |
| N45.0. | Absesləşmiş orxit, epididimit və orxoepididimit |
| N45.9. | Abses olması barədə məlumat olmayan orxit, epididimit və orxoepididimit |

Müalicə

1. Lorin-Epşteynə görə novokain blokadası;
2. Sefalosporin antibiotikləri – **Seftriakson (Ceftriaxon)** gündə 1 q, 2 dəfə, 7-10 gün ərzində, əzələdəxili (ambulator səviyyədə antibiotik profilaktikası tövsiyə olunur):
və ya **Siprofloksasin (Ciprofloxacin)** 500 mq, gündə 2 dəfə, 7-10 gün ərzində;
3. Analgetik preparatlar (ağrılar üçün) **Ketoprofen** 2,0, əzələdəxili, **Drotaverin (Drotaverine)** 2, əzələdəxili;
4. Antifungal: **Flukonazol (fluconazole)** 150 mq, 1 dəfə.

Ədəbiyyat

Воспалительные болезни органов мошонки (орхит и эпидидимит)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК- 2016 (Казахстан).

<https://u.to/I0MEIA>