

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	N - Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Pirverdiyeva A.
---	------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
N74.1*.	Qadın çanaq orqanlarının vərəm etiologiyalı iltihabi xəstəlikləri(A18.1+)

Müalicə

Həssas forma üçün ümumi müalicə kursu 6 aydan 11 aya qədərdir: 2-4 aydan intensiv faza (məhdud formada - 2 aydan 3 aya qədər, geniş yayılmış formada - 4 ay): **izoniazid (isoniazid) + rifampisin (rifampicin) + pirazinamid (pyrazinamide) + etambutol/streptomisin (ethambutol/streptomycin)** : daxilə, gündə 1 dəfə, acqarina; etambutol streptomisin ilə əvəz edildikdə 2 ay ərzində gündə bir dəfə, əzələdəxili. Ekstrapulmonar vərəm üçün müalicənin saxlanma mərhələsi 4-7 ay ərzində həyata keçirilir: **izoniazid (isoniazid) + rifampisin (rifampicin)**. İzoniazidə monorezistentlik halında, əlavə olaraq, gündə 1 dəfə acqarina **etambutol (ethambutol)** təyin edilir.

Vərəm əleyhinə dərmanların tövsiyə olunan gündəlik dozaları (mq).

Dərman preparatının adı	Gündəlik doza	İstifadə qaydası
-------------------------	---------------	------------------

	Çәki (kg)				
	30-39	40-54	55-70	более 70	
<i>İsoniazid (Isoniazid)</i>	200 mg	300 mg	300 mg	400 mg	Daxilә vә ya ә/d
<i>Rifampisin (Rifampicin)</i>	300 mg	450 mg	600 mg	750 mg	Daxilә vә ya v/d
<i>Pirazinamid (Pyrazinamide)</i>	1000 mg	1500 mg	2000 mg	2000 mg	Daxilә
<i>Etambutol (Ethambutol)</i>	600 mg	800 mg	1200 mg	1600 mg	Daxilә vә ya v/d

Әдәбиyyat

Внелегочный туберкулез

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2019 (Казахстан).

<https://shorturl.at/ahDFR>