

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	N-Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Pirverdiyeva A.
---	------------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
N02.0	Residiv verən və davamlı hematuriya, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular
N02.1	Residiv verən və davamlı hematuriya, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular
N02.2	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz membranoz qlomerulonefrit
N02.3	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit
N02.4	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit
N02.5	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit
N02.6	Residiv verən və davamlı hematuriya, sıx çöküntü xəstəliyi
N02.7	Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz oraşşəkilli qlomerulonefrit
N02.8	Residiv verən və davamlı hematuriya, digər dəyişikliklər

Müalicə

İzolyasiya olunmuş sidik sindromu:

Qan durulducu dərmanlar ən azı 1 ay ərzində təyin olunur: **dipiridamol (dipyridamole)** gündə 75-200 mq və ya **pentoksifilin (pentoxifylline)** gündə 300-600 mq

Stasionara yerləşdirmə üçün göstərişlər:

diaqnozun yoxlanılması; müalicənin təsirinin olmaması; vəziyyətin şiddətinin artması: kobud hematuriya epizodları, hipertoniyanın əmələ gəlməsi və ya müalicə olmayan hipertoniyanın olması və 3 ay ərzində glomerular filtrasiya sürətinin ilkin dəyərinin 30% -i azalması.

Ədəbiyyat

Рецидивирующая и устойчивая гематурия

Версия: Клинические протоколы МЗ РБ- 2011 (Беларусь).

https://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/000476_188880_920_pril_2_nefrologia.doc