

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	O - Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrü
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Məmmədova A.
---	---------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
O87.2	Zahılıq dövründə babasil

Müalicə

Qeyri-medikamentoz müalicə:

- pəhriz - qida rasionunda lif tərkibinin və maye qəbulunun artırılması
- nəcis yumşaldıcıların tətbiqi
- hər defekasiyadan sonra şəxsi gigiyenaya ciddi riayət edilməsi

Medikamentoz müalicə:

- **Troksevazin** (Troxevasin®) **gel** - gündə 2 dəfə səhər və axşam zədələnmiş nahiyəyə yerli tətbiq olunur;
- **Troksevazin® kapsulları** – 1 kapsul gündə 2-3 dəfə yemək vaxtı qəbul olunur; effektivliyinin artırılması üçün troksevazin gel ilə birlikdə istifadə olunması tövsiyə olunur. 6-7 gün ərzində xəstəliyin əlamətləri keçmirse və ya ağırlaşarsa, pasiyent təkrar həkimə müraciət etməlidir
- **Heparin məlhəmi** (Heparin ointment) – göstəriş olduqda, zədələnmiş nahiyəyə yerli istifadə üçün

Ədəbiyyat

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8894587/>

- Perianal Diseases in Pregnancy and After Childbirth: Frequency, Risk Factors, Impact on Women's Quality of Life and Treatment Methods. Published online 2022 Feb 18.

<https://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/CProtokol/%D0%9A%D0%9F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B>

[D%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B8 %D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8 %D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC %D0%B2 %D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5 %D0%B8 %D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82 %D0%9C%D0%97 19.02.2018 %E2%84%96 17.pdf](#)

- «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии» Клинический протокол, 2023