

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>P- Perinatal hallar</b>
---------------------------------	----------------------------

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Yusifova B.</b>
---	--------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>P02.0.</b>	Döl və yeni doğulmuşun cift gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri
<b>P02.1.</b>	Döl və yeni doğulmuşun, ciftin ayrılması və qanaxma ilə əlaqədar ağırlaşmalar nəticəsində zədələnmələri
<b>P02.3.</b>	Döl və yeni doğulmuşun plasental transfuziya sindromu ilə əlaqədar zədələnmələri
<b>P12.3.</b>	Doğuş travması nəticəsində başın tüklü hissəsinin hematoması

## **Müalicə**

### **Anemiyalarının profilaktikası**

Yenidoğulmuşlarda erkən anemiyanın qarşısının alınması və müalicəsi üçün **rekombinant eritropoietin (rEP)** həyatın 8-ci günündən 250 TV/kq dozada həftədə 3 dəfə 4-6 həftə müddətində subkutan inyeksiya şəklində təyin edilir.

Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda anemiya üçün rEP gündə 6 mq/kq bədən çəkisi dozasında dəmirin oral və ya venadaxili yeridilməsi, həmçinin **E vitamininin** 15-25 TV/gün dozası ilə birlikdə istifadə olunur.

Анемии новорожденных

Версия: Клинические рекомендации РФ 2013-2017 (Россия)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BF-%D1%80%D1%84-2015/16797>