

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	P- Perinatal hallar
---------------------------------	----------------------------

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Yusifova B.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
P22.0.	Yenidoğulmuşun tənəffüs pozuntusu (distresi) sindromu

Müalicə

RDS profilaktikası

Təvsiyələr

- Erkən doğuş riski yüksək olan hamilə qadınlar perinatal mərkəzlərə yerləşdirilməlidir
- Prenatal döl kisəsinin yırtılması zamanı vaxtından əvvəl doğuş, antibiotiklərin və tokolitiklərin təyin edilməsi ilə gecikdirilə bilər. Bu, hamilə qadının döl ilə in utero perinatal mərkəzə çatdırılması və RDS-nin qarşısını almaq üçün steroid terapiyasının aparılması üçün vaxta qənaət etməyə imkan verəcəkdir.
- Hamiləliyin 23-34-cü həftələri arasında vaxtından əvvəl doğuş riski olan bütün qadınlara antenatal kortikosteroidlərin bir kursu tövsiyə olunur. RDS-nin prenatal profilaktikası üçün 2 sxemdən istifadə edilə bilər:

- **betametazon** - 12 mq əzələdaxili, 24 saatdan sonra, hər kurs üçün yalnız 2 doza və ya

- **deksametazon** - 6 mq əzələdaxili, 12 saatdan sonra, hər kurs üçün cəmi 4 doza.

- Əgər birinci kurs 2-3 həftədən çox əvvəl verilibsə və körpənin hamiləlik yaşı 33 həftədən azdırsa və başqa məmaliq göstərişi varsa

antenatal steroidlərin təkrar kursu məqsədəuyğun ola bilər.

- Doğum tarixinə görə sancılar başlamazdan əvvəl planlaşdırılmış qeysəriyyə əməliyyatı olan qadınlar üçün də antenatal steroidlər nəzərdən keçirilməlidir.

Ədəbiyyat

Респираторный дистресс-синдром (неонатология)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан) Available from:

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/14735>