

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	ST-Travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələri
---------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Quliyeva P.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
T28.0	Ağız boşluğu və udlağın termiki yanığı
T28.5	Ağız boşluğu və udlağın kimyəvi yanığı

Müalicə

Xəstə kateqoriyası: Böyüklər.

Müalicə taktikası:

Travmatik amilin aradan qaldırılması.

Ağız boşluğunun selikli qişasının epitelizasiyası.

Dərman müalicəsi ambulator şəraitdə aparılır:

Yerli dərman müalicəsi:

1. Lidokain (Lidocaine) hidroxlorid, məhlul, ağız boşluğunun selikli qişasına tətbiq etmək üçün 1%, yeməkdən əvvəl ağrıları azaltmaq və zədə almış elementləri ağrı azalana qədər müalicə etmək üçün.

2. Xlorheksidin (Chlorhexidine) diqlukonat, məhlul, ağız boşluğunun müalicəsi üçün gündə 3 dəfə epitelizasiya başlamazdan əvvəl 0,05%.

3. Tokoferol asetat (Tocopherol) , yağ məhlulu, 30%, tam epitelizasiyaya qədər aplikasiya şəklində.

Ədəbiyyat

1. Острые травматические повреждения слизистой оболочки полости рта

Клинические протоколы МЗ РК - 2015 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%82%D0%B0/14269>

