

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	Travmalar, zəhərlənmələr
---------------------------------	---------------------------------

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Daşdəmirov Ü.
---	----------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
T81.1	Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlardan sonra və ya prosedurlar zamanı şok

Müalicə

Ambulator mərhələdə

(təcili tibbi yardım, klinika) qayğının təşkili sepsis və/və ya septik/şok (q-SOFA şkalası) ehtimal olunan diaqnozu olan xəstələrin müəyyən edilməsinə və bunun ən tez çətdirilməsinə yönəldilməlidir. xəstəni xəstəxanaya.

Qeyri-farmakoloji müalicə : burun kanülləri (1-6 l/dəq) və ya üz maskası 5-10 l/dəq [9] vasitəsilə oksigen terapiyasının [12] başlanması, qeyri-invaziv/invaziv tənəffüs dəstəyi, hadisə zamanı əsas kardiopulmoner reanimasiya klinik ölüm.

Dərman müalicəsi :

Oksigen terapiyası

NaCl 0.9% 400-800 ml

Norepinefrin 1 ml+200 ml NaCl

Fenilefrin 1 ml+200 ml NaCl

Epinefrin 1 ml+200 ml NaCl

Cərrahi müdaxilə: yox.

Əlavə idarəetmə : xəstəxana səviyyəsində.

Protokolda təsvir olunan müalicənin effektivliyi və diaqnostik və müalicə üsullarının təhlükəsizliyinin göstəriciləri :

Müvəqqəti meyarlar:

- zərurət olduqda, vazopressorların mümkün istifadəsi ilə septik şok diaqnozu qoyulduğu andan (UD - IA, SSC 2016) kristalloid məhlullarla infuziya terapiyasına başlamaq (Əlavə 5);
- qan təzyiqinin sabitləşməsi (65 mm Hg-dən yuxarı qan təzyiqinin artması);
- nəbz oksimetrik qan doymasına nail olmaq >90%[15].

Ədəbiyyat

Сепсис

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2020 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81-2020/16395>