

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	ST-Travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələri
-------------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Quliyeva P.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
T08	Onurğanın dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə sınığı
T09	Onurğanın və gövdənin dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər travmaları
T10	Yuxarı ətrafların dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə sınığı
T11	Yuxarı ətrafların dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər travmaları
T12	Aşağı ətrafların dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə sınığı
T13	Aşağı ətrafların dəqiqləşdirilməmiş səviyyədə digər travmaları
T14	Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı travma

Müalicə

Səthi zədələnmə üçün yerli soyuq tətbiq edin və zədələnmiş, yara olan səthləri yodonat məhlulu ilə müalicə edin. Lazım olarsa aseptik sarğıdan istifadə etmək.

Dərman müalicəsi ambulator şəraitdə aparılırsa:

Oynaq-bağ aparatının zədələnməsi, oynaqların yerindən çıxması zamanı

–

analgin 50% məhlulu 2-4 ml əzələdaxili Ə.D (şiddətli ağrılar zamanı), nəqliyyat immobilizasiyası lazım olarsa.

Yuxarı,aşağı ətraf sümüklərinin qapalı sınıqları üçün –

analgin 50% məhlulu 2-4 ml əzələdaxili Ə.D və ya **Tramal** 100-200 mq əzələdaxili Ə.D (venadaxili V.D).

Nəqliyyat immobilizasiyası.

Şok əleyhinə tədbirlər:

Kristalloid məhlulları və ya **poliqlükin (reopoliqlükün)** 400 ml və ya daha çox venadaxili V.D.

Steroid hormonları (prednizolon 60-90 mq, **hidrokortizon** 120-240 mq) vena daxili infuziya məhlulunda damcı formasında.

Qan təzyiqi qeyri-sabitdirsə, pressor aminlərindən istifadə edin: sistolik qan təzyiqini 90-100 mm.c.süt səviyyəsində saxlamaq üçün, 1 ml **dopamin** 0,5% məhlulu 400 ml infuziya məhlulunda dəqiqədə 8-10 damcı V.D. yeritmək.

Nəqliyyat immobilizasiyası - baǵ- oynaǵ aparatının zədələnməsi zamanı: Bərkidici sarǵı.

Böyük oynaq çıxıntıları zamanı-əldə edilmiş vəziyyətdə immobilizasiya aparılır. Şinlərdən istifadə olunur.

Onurǵanın travmaları zədələnməsi halında, boyun yaxası istifadə edərək immobilizasiya aparılır.Kramer şinlərdən istifadə olunur.

Əsas dərmanların siyahısı:

Tramadol (Tramadol) kapsul 50 mq; ampulada məhlul 50 mq/1 ml

Prednizolon (Prednisolone) inyeksiya üçün məhlulu 30 mq/ml; tablet 5 mq

İnyeksiya üçün **hidrokortizon (Hydrocortisone)** suspenziyası 2 ml, 5 ml

Ampulada inyeksiya üçün **dopamin (Dopamine)** məhlulu 0,5%, 4% 5 ml

10 ml, 20 ml flakonda 5% **yod (Iod)** spirti məhlulu

Ədəbiyyat

Травмы закрытые и вывихи

Клинические протоколы МЗ РК - 2007

<https://diseases.medelement.com/disease/12724>