

Xəstəlik sinifi (XBT-10)	ST-Travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələri
-------------------------------------	--

İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)	Quliyeva P.
---	--------------------

XBT-10 rubrikası	Xəstəliklər
S20	Döş qəfəsinin səthi travması
S21	Döş qəfəsinin açıq yarası
S22	Qabırğanın (qabırğaların), döş sümüyünün və onurğanın döş şöbəsinin sınığı
S23	Döş qəfəsinin kapsul-bağ aparatının çıxığı, gərilməsi və artıq dərəcədə gərginləşməsi
S24	Döş şöbəsində onurğa beyninin və sinirlərin travması
S25	Döş şöbəsində qan damarlarının travması
S26	Ürəyin travması
S27	Döş boşluğunun digər və dəqiqləşdirilməmiş orqanlarının travması
S28	Döş qəfəsinin əzilməsi və döş qəfəsi hissəsinin travmatik amputasiyası
S29	Döş qəfəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş travmaları

Müalicə

Ambulator Müalicə.

Döş qəfəsinin əzilməsi,zədəsi.

Əsas dərmanların siyahısı:

Natrium xlorid (Sodium chloride) 0,85% məhlulu- 540 ml/saat dozada (180 damcı/dəqiqəyə qədər),venadaxili, davamlı damcı infuziyası şəklində, gündə 1000 ml orta doza.

Dekstran 60 (Dextran60) - 90 dəqiqəlik (sürətləndirilmiş) müalicə rejimi, simptomların başlanmasından sonra 6 saat ərzində müalicəyə başlamaq olar.

15 mq – venadaxili.

50 mq - ilk 30 dəqiqə ərzində venadaxili infuziya, ardınca maksimum doza - 100 mq-a çatana qədər, 60 dəqiqə ərzində 35 mq infuziya.

Novokain (Novocaine) 0,25% məhlulu, 500 ml-dən çox olmasın və 150 ml 0,5%-li məhlul.

Diazepam(Diazepam) 0,2 mq/kq, yetkinlər üçün ümumi istifadə olunan doza 10-20 mq təşkil edir.

Natrium hidroksibutirat (Sodium hydroxybutyrate)- böyüklərə 70-120 mq/kq bədən çəkisi nisbətində təyin edilir .

Zəifləmiş xəstələrə 50-70 mq/kq bədən çəkisi nisbətində təyin edilir.

Solüsyonu yavaş-yavaş, 1-2 ml/dəq yeridilir.

Dopamin (Dopamine)- ilkin infuziya sürəti dəqiqədə 2-5 mkq/kq təşkil edir, tədricən 5-dən 10 mkq/kq/dəq-ə qədər, optimal doza 50 mkq/kq/dəqədək artırıla bilər.

Fentanil (Fentanyl)- şiddətli ağrıları azaltmaq üçün fentanil - əzələdaxili və ya venadaxili 0,5 - 1 - 2 ml (0,025 - 0,05 - 0,1 mq fentanil)

Ibuprofen (Ibuprofen)- gündə 3 dəfə 200 mg, ilkin dozada təyin edilir.

AMBULATOR MÜALİCƏ QAYDASI VƏ DƏRMAN RORMASI EYNI QAYDADA DÖŞ QƏFƏSİNİN TRAVMALARINA AİDDİR.

Qabırğanın, döş sümüyünün sınığı:

Əsas dərmanların siyahısı:

Prokain (Procaine) 1% və 0,25% həll 500 ml-dən çox olmayan 0,25% həll, və 150 ml 0,5% məhlul.

Natrium xlorid 0,85% məhlulu (Sodium chloride)- 540 ml/saat dozada (180 damcı/dəqiqəyə qədər), venadaxili, davamlı damcı infuziyası şəklində, gündə 1000 ml orta doza.

Dekstran 60 (Dextran60) - 90 dəqiqəlik (sürətləndirilmiş) müalicə rejimi, simptomların başlanmasıdan sonra 6 saat ərzində müalicəyə başlamaq olar.

15 mq – venadaxili.

50 mq - ilk 30 dəqiqə ərzində venadaxili infuziya, ardınca maksimum doza - 100 mq-a çatana qədər, 60 dəqiqə ərzində 35 mq infuziya.

Novokain (Novocaine) 0,25% məhlulu, 500 ml-dən çox olmasın və 150 ml 0,5%-li məhlul.

Diazepam(Diazepam) 0,2 mq/kq, yetkinlər üçün ümumi istifadə olunan doza 10-20 mq təşkil edir.

Natrium hidroksibutirat (Sodium hydroxybutyrate)- böyüklərə 70-120 mq/kq bədən çəkisi nisbətində təyin edilir .

Zəifləmiş xəstələrə 50-70 mq/kq bədən çəkisi nisbətində təyin edilir.

Solüsyonu yavaş-yavaş, 1-2 ml/dəq yeridilir.

Dopamin (Dopamine)- ilkin infuziya sürəti dəqiqədə 2-5 mkq/kq təşkil edir, tədricən 5-dən 10 mkq/kq/dəq-ə qədər, optimal doza 50 mkq/kq/dəqədək artırıla bilər.

Fentanil (Fentanyl)- şiddətli ağrıları azaltmaq üçün fentanil - əzələdaxili və ya venadaxili 0,5 - 1 - 2 ml (0,025 - 0,05 - 0,1 mq fentanil)

İbuprofen (Ibuprofen)- gündə 3 dəfə 200 mg, ilkin dozada təyin edilir.

Qabırğanın (qabırğaların) sınığı

Əsas dərmanların siyahısı:

Prokain (Procaine) 1%

Natrium xlorid 0,85% məhlulu (Sodium chloride)

Dekstran 60 (Dextran60)

Novokain (Novocaine) 0,25%

Diazepam(Diazepam) 0,2 mq/kq

Natrium hidroksibutirat (Sodium hydroxybutyrate)

Dopamin (Dopamine)

Fentanil (Fentanyl)

İbuprofen (Ibuprofen)

Ürəyin travması(Digər ürək xəsarətləri)

Əsas dərmanların siyahısı:

Natrium xlorid 0,85% məhlulu (Sodium chloride)

Dekstran 60 (Dextran60)

Novokain (Novocaine) 0,25%

Diazepam(Diazepam) 0,2 mq/kq

Natrium hidroksibutirat (Sodium hydroxybutyrate)

Dopamin (Dopamine)

Fentanil (Fentanyl)

İbuprofen (Ibuprofen)

Döş qəfəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş travmaları-

Əsas dərmanların siyahısı:

Prokain (Procaine) 1%

Natrium xlorid 0,85% məhlulu (Sodium chloride)

Dekstran 60 (Dextran60)

Novokain (Novocaine) 0,25%

Diazepam(Diazepam) 0,2 mq/kq

Natrium hidroksibutirat (Sodium hydroxybutyrate)

Dopamin (Dopamine)

Fentanil (Fentanyl)

Atropinin (Atropine) birdəfəlik dozası – 0,001 q, gündəlik – 0,003 q

Hemodinamik parametrlərin məcburi daimi monitorinqi!

Əlavə dərmanların siyahısı:

Poliqlükün (Polyglukin) 400,0 ml, simptomların başlanmasından sonra 6 saat ərzində müalicəyə başlamaq mümkün olan, 90 dəqiqəlik (sürətləndirilmiş) rejim.

Natrium xlorid (Sodium chloride) , ***kalium xlorid (Potassium chloride)*** , ***natrium hidroxlorid (Sodium chloride)*** 400,0 ml, orta doza gündə 1000 ml venadaxili, davamlı damcı infuziyası olaraq 540 ml/saat dozada (180 damcı/dəqiqəyə qədər).

Dekstroza (Dextrose) 5% - 400,0 ml, dəri altı (500 ml-ə qədər), venadaxili damcı yolu ilə (внутривенно капельно) 7 ml/dəq (150 damcı/dəq), maksimal gündəlik doza 2000 ml.

Закрытые и открытые повреждения груди. Раны сердца, пневмоторакс, гемоторакс

Клинические протоколы МЗ РК - 2016 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81-2016/147>