

<b>Xəstəlik sinifi (XBT-10)</b>	<b>ST-Travmalar, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin digər nəticələri</b>
-------------------------------------	--

<b>İlkin versiyanın tərtibatçı (İSİM)</b>	<b>Quliyeva P.</b>
---	--------------------

<b>XBT-10 rubrikası</b>	<b>Xəstəliklər</b>
<b>T26</b>	<b>Göz və onun əlavə aparatı ilə məhdudlaşmış termiki və kimyəvi yanıqlar</b>

### **Müalicə**

**Xəstə kateqoriyası: Böyüklər və uşaqlar**

**Müalicə məqsədləri:**

Göz toxumalarının iltihabi reaksiyasının azalması

Ağrının kəsilməsi

Gözün səthinin bərpası (epitelializasiya).

**Müalicə taktikası :**

**Dərman müalicəsi:**

**Birinci dərəcəli yanıqlarda** – müalicə ambulator şəraitdə, oftalmoloqun nəzarəti altında aparılır.

**II-IV dərəcəli yanıqlar üçün** - xəstəxanada təcili xəstəxanaya yerləşdirmə göstərilir.

**Ambulator şəraitdə dərman müalicəsi (birinci dərəcəli yanıqlar üçün) :**

**Göz qapaqlarında və konyunktivada** toz halında kimyəvi maddə və ya onun parçaları varsa, onu nəm pambıq və ya nəm parça ilə çıxarın.

**Yerli anesteziqlər** (*oksibuprokain Oxybuprocaine* 0,4% və ya *proksimetakain Proxymetacaine* 0,5%) konyunktiva boşluğuna bir dəfə 1-2 damcı.

**Bol, uzunmüddətli (ən azı 20 dəqiqə),** konyunktiva boşluğunun sərin ( $12^{\circ}$ - $18^{\circ}$ C ) axar su və ya inyeksiya üçün su ilə yuyulması (yuyulma zamanı xəstənin gözləri açıq olmalıdır)

**Yerli antibakterial preparatlar** (*xloramfenikol Chloramphenicol* oftalmik 0,25% və ya *siprofloksasin Ciprofloxacin oftalmik* 0,3% və ya *ofloksasin Ofloxacin oftalmik* 0,3%) – 1 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər üçün konyunktival boşluq yuyulduqdan dərhal sonra, həmçinin gündə 4 dəfə epibulyar olaraq 1 damcı 5-7 günlər (yoluxucu ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün)

**Midriatiklər** (dərman seçimi həkimin ixtiyarındadır) – *siklopentolat Cyclopentolate* 1%, *tropikamid Tropikamid* 1%, *fenilefrin Phenylephrine oftalmik* 2,5% və 10% epibulbar 1-2 damcı gündə 3 dəfəyə qədər 3-5 gün ərzində iltihab prosesinin inkişafını qarşısını almaq üçün.

**Stasionar səviyyədə ikinci II dərəcəli yanıqlar, III-IV dərəcəli yanıqların dərman müalicəsi aparılır.**

Yüngül yanıqlar üçün müalicə ambulator oftalmoloqun nəzarəti altında aparılır.

Stasionar müalicə başa çatdıqdan sonra xəstə zəruri tövsiyələrlə (dispanser müayinələrinin həcmi və tezliyi) yaşayış yeri üzrə (1 ilədək) oftalmoloqda qeydiyyatda alınır.

## Әдәбиyyat

### Термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата

Клинические протоколы МЗ РК - 2015 (Казахстан)

<https://diseases.medelement.com/disease/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/14391>